



EYLÜL 2021 TUS

Orijinal Sorular

Eylül 2021 TUS

İlk 10'da **11**
İlk 100'de **63**
kişi

Mart 2021 TUS

İlk 10'da **9**
İlk 100'de **66**
kişi

Eylül 2020 TUS

İlk 10'da **6**
İlk 100'de **71**
kişi

Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz...

9 BÜYÜK DAMGA

VARAN 1



TUS Birincisi TUSDATA'dan
Dr. Onat GÜNER
Fakülte derecesi değil

VARAN 2



VARAN 3



VARAN 4



TUSDATA'dan

VARAN 5

İL BİRİNCİLERİMİZ



VARAN 6



FAKÜLTE DERECESİ DEĞİL

VARAN 7



ÜÇ BÜYÜK İLDE DEĞİL

VARAN 8



REFERANS VERDİ

VARAN 9



TUS EYLÜL 2021

TEMEL BİLİMLER TESTİ

1. Ağaçtan düşme sonrası, ayağında ağrı ve şişme şikâyetleri nedeniyle acil polikliniğe başvuran hastanın fizik muayenesinde ayak tabanında yaygın ağrısı olduğu ve ayak medial kemerinde çökme olduğu anlaşıyor. Hastanın lateral ayak bileği grafisinde caput tali'nin inferiora doğru disloke olduğu görülüyor.
- Bu hastada yaralanmış olması en olası anatomik yapı aşağıdakilerden hangisidir?**
- A) Aponeurosis plantaris
B) Ligamentum calcaneonaviculare plantare
C) Ligamentum talocalcaneum mediale
D) Ligamentum plantare brevis
E) Ligamentum plantare longum
2. Aşağıdaki eklemlerden hangisi eklem yüzünün şekline ve hareketlerine göre, articulatio plana grubu içerisinde değerlendirilir?
- A) Articulatio acromioclavicularis
B) Articulatio radioulnaris proximalis
C) Articulatio atlantoaxialis mediana
D) Articulatio carpometacarpalis pollicis
E) Articulationes metacarpophalangeae
3. Plexus brachialis bloğu yapılan 68 yaşındaki kadın hastada, işlem sonrasında scapula alata gelişiyor. Fizik muayenede istirahat halindeyken scapula'nın eleve ve hafif medial rotasyonda olduğu görülüyor.
- Bu hastada, plexus brachialis bloğu esnasında aşağıdaki sinirlerden hangisinin yaralanmış olması en olasıdır?**
- A) Nervus accessorius
B) Nervus dorsalis scapulae
C) Nervus suprascapularis
D) Nervus thoracicus longus
E) Nervus axillaris
4. Scapula'nın angulus inferior'u fizik muayenede yüzeyel anatomik işaret noktası olarak sıklıkla kullanılır.
- Anatomik duruştaki erişkin bir kişide angulus inferior aşağıdaki vertebral düzeylerden hangisinde yer alır?**
- A) T3
B) T5
C) T7
D) T9
E) T11
5. Arteria tibialis posterior'dan nabız alabilmek için en uygun bölge aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Ön tarafta malleolus lateralis ve medialis'in arası
B) Malleolus lateralis'in önü
C) Malleolus lateralis'in arkası
D) Malleolus medialis'in önü
E) Malleolus medialis'in arkası
6. Sağ gözünü aşağı, yukarı ve mediale hareket ettirememesi şikâyetleriyle hastaneye başvuran 35 yaşındaki kadın hastada tentorial herniasyon olduğu saptanıyor.
- Bu hastada görülen klinik tabloya yol açan basının aşağıdaki sinirlerden hangisinde meydana gelmiş olması en olasıdır?**
- A) Nervus opticus
B) Nervus oculomotorius
C) Nervus trochlearis
D) Nervus trigeminus
E) Nervus abducens
7. Ayağın lateral bölgesindeki minör bir cerrahi girişim için malleolus lateralis'in hemen arkasından subkutanöz lokal anestezi enjekte eden bir cerrahın bloke etmeyi amaçladığı en olası sinir aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Nervus tibialis
B) Nervus fibularis profundus
C) Nervus saphenus
D) Nervus fibularis superficialis
E) Nervus suralis



Dr. Onat GÜNER
Teme: 80.204 Klinik: 79.519
Fakülte derecesi değildi

TÜRKİYE İKİNCİSİ

DENİZLİ İL BİRİNCİSİ



Dr. Tarık DÜZENLİ
T.Puanı : 78.766 K.Puanı : 78.914

Gururla...



"Aylarını ellerini, istifa bakamaz"

• 27 Eylül 2021 itibariyle...

• TUSDATA; 37 TUS önce kurs faaliyetine başlamıştır..

8. Vücuda ait bilinçli proprioseptif, iki nokta diskriminasyonu ve vibrasyon duyularının taşındığı yol aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Tractus spinothalamicus anterior
B) Fasciculus gracilis ve cuneatus
C) Tractus spinotectalis
D) Tractus spinocerebellaris posterior
E) Tractus spinothalamicus lateralis
9. Beyin omurilik sıvısı sirkülasyonunda rol alan "granulationes arachnoideae"nin çevresinde en fazla bulunduğu dura mater sinüsü aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Sinus sagittalis superior
B) Sinus sagittalis inferior
C) Sinus sigmoideus
D) Sinus petrosus inferior
E) Sinus cavernosus
10. Aşağıdakilerden hangisi membrana quadrangularis'in serbest alt kenarıdır?
- A) Ligamentum vocale
B) Ligamentum vestibulare
C) Plica aryepiglottica
D) Ligamentum thyroepiglotticum
E) Conus elasticus
11. Spermium'un ovum'u en sık dölediği yer aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Infundibulum tubae uterinae
B) Fimbriae tubae uterinae
C) Ampulla tubae uterinae
D) Isthmus tubae uterinae
E) Ostium abdominale tubae uterinae
12. İnguinal kanala anulus inguinalis profundus'tan girerek labium majus pudendi'nin subkutanöz dokularına kadar uzanabilen anatomik yapı aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Ligamentum sacrotuberale
B) Ligamentum cardinale
C) Ligamentum rectouterinum
D) Ligamentum pubocervicale
E) Ligamentum teres uteri
13. Kolesistektomi sırasında arteria cystica bağlanırken kılavuz bir bölge olan Calot üçgeninin medial kenarını aşağıdaki anatomik yapılardan hangisi oluşturur?
- A) Ductus choledochus
B) Ductus cysticus
C) Ductus hepaticus communis
D) Ductus hepaticus sinister
E) Ductus pancreaticus
14. Hem omentum minus hem de omentum majus'un yapıştığı organ ve organ bölümü aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
- A) Karaciğer – Lobus quadratus
B) Mide – Curvatura major
C) Mide – Incisura angularis
D) Duodenum – Pars superior
E) Duodenum – Pars inferior
15. Aşağıdakilerden hangisinin yapısında E-kaderin-katenin kompleksi bulunur?
- A) Zonula okludens
B) Zonula adherens
C) Hemidesmozom
D) Fokal adezyon
E) Gap junction
16. Aşağıdaki epitel dokularından hangisinde, farklılaşmamış prekürsör olan ve "bazal hücre" olarak adlandırılan hücre tipi bulunmaz?
- A) Olfaktör mukoza epiteli
B) Kornea epiteli
C) Ürotelyum
D) Trakea epiteli
E) Böbrek toplayıcı tübül epiteli
17. Aşağıdakilerden hangisi düz kas dokusunda bulunmaz?
- A) Kaveol
B) Yoğun cisimcik
C) Aktin
D) Troponin
E) Eksternal lamina

Eylül 2021 TUS Sınavında

ÜÇ BÜYÜK İLDE DEĞİLDİ

İle TUS 4.sü oldu!

GENÇAY KARANLIK

T.Puan : 77,947

K.Puan: 77,906

BURSA ULUDAĞ
ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

BURSA ŞUBE

37 TUS
32
BİRİNCİ

Detaylı bilgi için: www.tusdata.com



Eylül 2021 TUS Derecelerimiz

İLLERE ve FAKÜLTELERE bakın...

Adı Soyadı	Fakültesi	Temel Sıra	Klinik Sıra	Fakülte Derecesi (ilk 3)
Onat GÜNER	Ankara TIP (Ankara TUSDATA)	1	1	DEĞİL
Tarık Düzenli	Pamukkale TIP (Denizli TUSDATA)	2	2	DEĞİL
Berk Kaan AKTAŞ	Ankara TOBB TIP (Ankara TUSDATA)	3	3	+
Muhammed ÖZDEMİR	Cerrahpaşa TIP (İstanbul TUSDATA)	9	4	+
Mustafa Talha OKUTAN	Necmettin Erbakan TIP (Konya TUSDATA)	13	6	DEĞİL
Gençay KARANLIK	Uludağ TIP (Bursa TUSDATA)	4	7	DEĞİL
Gökhan DOĞAN	Gaziantep TIP (Gaziantep TUSDATA)	4	7	+
Burak YILDIZ	Demiroğlu Bilim TIP (İstanbul TUSDATA)	7	9	DEĞİL
Eren COŞKUN	Ankara Yüksek İhtisas TIP (Ankara TUSDATA)	12	10	+
Furkan YILDIRIM	Dokuz Eylül TIP (İzmir TUSDATA)	6	11	DEĞİL
Süleyman AYIK	Kütahya TIP (Kütahya - Eskişehir TUSDATA)	8	12	+

Bu tablo; il ve fakülte farketmeksizin herkese
ama herkese **UMUT** vermiyor mu?



18.

- I. SRY'nin SOX9 ekspresyonunun sağlaması
- II. SRY'nin WNT4'ün ekspresyonunu aktive etmesi
- III. SRY'nin steroidogenezis faktörünü (SF1) uyarması

Yukarıdaki moleküler olaylardan hangileri gonadların testis yönünde farklılaşmasında rol oynar?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) II ve III

19. Üreter tomurcuğunun metanefrik blasteme girmemesi sonucunda aşağıdaki anomalilerden hangisi ortaya çıkar?

- A) Üreter duplikasyonu
- B) Ektopik üreter
- C) Pelvik böbrek
- D) Böbrek agenezisi
- E) At nalı böbrek

20. Aşağıdaki hormonlardan hangisinin hipofizden salgılandığı bölgenin embriyonik kökeni diğerlerinden farklıdır?

- A) Somatotropin (büyüme hormonu)
- B) Prolaktin
- C) Tirotropin (tiroid stimüle edici hormon)
- D) Oksitosin
- E) Folikül stimüle edici hormon

21. "Major basic protein" (MBP) ile birlikte antiparazitik etki gösteren molekül ve salgılandığı kan hücresi hangisidir?

- A) Katepsinler - Eozinofil
- B) Lökotrienler - Bazofil
- C) Eozinofil katyonik protein - Eozinofil
- D) Metalloproteinazlar - Nötrofil
- E) Miyeloperoksidaz - Nötrofil

22. Aşağıdaki hücrelerden hangisi Peyer plaklarında "gut-associated lymphoid tissue" (GALT) ile ilişkilidir?

- A) Paneth hücresi
- B) Bazal hücre
- C) Enteroendokrin hücre
- D) Goblet hücresi
- E) M hücresi

23. Hücre membranında bulunan G proteinleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Heterotrimerik G proteini, alfa alt birimine GTP bağlanması ile aktive olur.
- B) Fosfolipaz C, Gq aracılı iletide rol oynayan enzimlerdendir.
- C) G_s aracılığı ile adenilil siklazın aktive olması, hücre içinde cAMP'nin artışı ile sonuçlanır.
- D) G_i aracılığı ile aktive olan inozitol trifosfat, endoplazmik retikulumdan Ca²⁺ salıverilmesini sağlar.
- E) Hücre içinde cAMP artışı, proteinkinaz A'yı aktive ederek hedef proteinleri fosforile eder.

24. Gama motor nöronun inerve ettiği yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ekstrafüzal iskelet kası lifleri
- B) İntrafüzal iskelet kası lifleri
- C) Tek üniteli düz kas lifleri
- D) Çok üniteli düz kas lifleri
- E) Renshaw hücreleri

25. Aşağıdakilerden hangisi iskelet kası sarkoplazmik retikulum lümeninde Ca²⁺ bağlayan proteindir?

- A) Troponin
- B) Kalsekuestrin
- C) Dihidropiridin
- D) Riyanodin
- E) İnozitol trifosfat

26.

- I. Sinüs düğümü pacemaker hücre sayısı
- II. Arteriyel kompliyans
- III. Nabız basıncı
- IV. Erken diyastolik doluş hacmi

Kardiyovasküler sistemde yaşlanmaya bağlı olarak yukarıdakilerden hangileri azalır?

- A) I ve II
- B) I, II ve III
- C) I, II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

27. Aşağıdakilerden hangisinin arteriyel kan basıncında artışa neden olması en az olasıdır?

- A) Aort kompliyansının artması
- B) Kalp debisinin artması
- C) Atım hacminin artması
- D) Venöz vazokonstriksiyon
- E) Arteriyoller vazokonstriksiyon

28.

- I. Parietal hücreleri uyarır ve asit yapımını artırır.
- II. Enterokromafin benzeri (ECL) hücreleri uyarır ve asit yapımını azaltır.
- III. D hücrelerini uyarır ve asit yapımını artırır.
- IV. G hücrelerini gastrin serbestleştirici peptid (GRP) aracılığıyla uyarır ve asit yapımını artırır.

Nervus vagus'un asit yapımı üzerindeki etkisi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

- A) I ve III
- B) I ve IV
- C) II ve III
- D) I, II ve IV
- E) II, III ve IV

29. Aşağıdakilerden hangisi büyüme hormonunun metabolik etkilerinden değildir?

- A) Hücre içine amino asit transportunu hızlandırmak
- B) Enerji için yağ asitlerinin kullanımını arttırmak
- C) İskelet kasına glukoz girişini arttırmak
- D) Fazla salgılandığında karaciğerde asetoasetik asit yapımını arttırmak
- E) DNA'nın transkripsiyon hızını ve RNA miktarını arttırmak

30. Kan glukozunun artışı pankreasın Langerhans adacıkları beta hücrelerinden insülin ekzositozunu tetikler.

Bu mekanizma sırasında beta hücrelerinde inhibisyona uğrayan membran proteini aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Voltaj-kapılı Na⁺ kanalı
- B) Na⁺/Ca²⁺ antiporteri
- C) Voltaj-kapılı Ca²⁺ kanalı
- D) ATP duyarlı K⁺ kanalı
- E) Na⁺/K⁺ ATPaz pompası

31. Aşağıdakilerden hangisinin hasarında yüksek frekanslı seslere (>5.000 Hz) karşı işitme kaybı oluşma olasılığı daha yüksektir?

- A) Reissner zarının oval pencereye yakın kısmında
- B) Reissner zarının helikotremaya yakın kısmında
- C) Baziller zarın oval pencereye yakın kısmında
- D) Baziller zarın orta kısmında
- E) Baziller zarın helikotremaya yakın kısmında

32. Aşağıdakilerden hangisi, ağrı lifleri üzerine presinaptik veya lateral inhibisyonlar yapan santral analjezik sistem aktivasyonu ile ilişkili değildir?

- A) Periventricüler nukleus ve periaquaduktal gri cevherdeki enkefalinergic nöronlar
- B) Pons'ta rafe magnus çekirdeğindeki serotonergic nöronlar
- C) Spinal kord arka boynuzundaki enkefalinergic nöronlar
- D) Spinal kord arka boynuzundaki presinaptik ve postsinaptik inhibisyon yapan GABAergic nöronlar
- E) Spinal kord arka boynuzundaki kalsitonin gen ilişkili peptid salgılayan nöronlar

33.

- I. Glukoz 6-fosfat dehidrojenaz
- II. Gliseraldehit-3-fosfat dehidrojenaz
- III. Sitozolik malik enzim

Yukarıdaki enzimlerden hangileri NADPH oluşumunun gerçekleştiği bir basamağı katalizler?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III



“KULLANICI DOSTU”



Ekim 2020 TUS

233

soruya referans verdi.

★ Ekim 2020 TUS birincisi
217,5 net yapmıştır.

Mart 2021 TUS

227

soruya referans verdi.

★ Mart 2021 TUS birincisi
212,75 net yapmıştır.

Eylül 2021 TUS

230

soruya referans verdi.

★ Eylül 2021 TUS birincisi
209 net yapmıştır.

REKOR PUANLAR YAPTIRAN

Sampiyonların Notu

Kanıtı dayalı net referanslar için www.tusdata.com

34.

- I. NADPH'ye bağımlı bir enzimdir.
- II. Sorbitol ve galaktitol oluşumundan sorumludur.
- III. Eksikliği sonucunda herediter fruktoz intoleransı ortaya çıkar.
- IV. Lens, retina ve periferik sinirler gibi insüline duyarlı olmayan dokularda yüksek aktivite gösterir.

Aldoz redüktaz ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) III ve IV
- D) I, II ve IV
- E) II, III ve IV

35. Analiz öncesi beklemesi gereken kan örneklerinde glukoz analizini doğru olarak yapabilmek için kan alma tüpünde aşağıdakilerden hangisi bulunmalıdır?

- A) Sodyum sitrat
- B) Heparin
- C) Okzalit
- D) Sodyum florür
- E) Potasyum klorür

36. Çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniğine getirilen 9 aylık bir bebeğin fizik muayenesinde; güneşe maruz kalan deri alanlarında hiperpigmentasyon, ülseratif deri lezyonları ve premalign değişiklikler saptanıyor. Yapılan genetik analizler sonucunda nükleotit eksizyon onarım defekti tanısı konuluyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu semptomlara yol açabilecek en olası DNA hasarıdır?

- A) Transizyon mutasyonu
- B) İnsersiyon ve delesyon
- C) Pirimidin dimerlerinin oluşumu
- D) Baz metilasyonu
- E) DNA çift zincir kırıkları

37.

- I. Denatürasyon sonucu DNA'nın 260 nm'deki UV absorpsansı artar.
- II. Guanin-sitozin eşleşmelerinin oranı arttıkça Tm değeri yükselir.
- III. Denatürasyon sonucu fosfodiester bağları kopar.

B-DNA'nın denatürasyonu ve "melting temperature" (Tm) ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

38. Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin tersiyer yapısında, R yan zinciri ile hidrojen bağı oluşturarak katkıda bulunur?

- A) Asparajin
- B) İzolösin
- C) Valin
- D) Metiyonin
- E) Alanin

39. Aşağıdaki plazma proteinlerinden hangisi retinoli bağlar?

- A) Prealbümin
- B) α_1 -antitripsin
- C) α_2 - makroglobulin
- D) Haptogloblin
- E) Transferrin



BRANŞ BRANŞ

MEGA

PAKETLER

Sınava kadar AÇIK.
İstedğin zaman
SEYRET!

Geniş Konu Anlatımı

+

Tüm Tus Soru Kampı

+

Hızlı Tekrar Kampı

+

Hedef 70 Soru Kampı

+

Vaka Soru Çözümleri

Satın almak için: www.tusdataonline.com

40. Aşağıdakilerden hangisinin sentezinde S-adenozilmetiyonin kullanılmaz?
- A) Norepinefrinden epinefrin sentezi
B) Asetilserotonininden melatonin sentezi
C) Guanidoasetattan kreatin sentezi
D) Homosisteinden homosistin sentezi
E) Fosfatidiletanolaminden fosfatidilkolin sentezi
41. Aşağıdakilerden hangisi, fenilalaninin R yan zincirinin suda çözünürlük özelliğini tanımlamak için kullanılır?
- A) Polar ve yüksüz
B) Polar ve negatif yüklü
C) Polar ve pozitif yüklü
D) Amfipatik
E) Nonpolar
42. Bir amino asitin üç farklı pH değerinde çözeltileri hazırlanıyor ve bu çözeltilerden elektrik akımı geçiriliyor. Bu amino asit, pH=2,0'de katoda, pH=11,0'de anoda göç ediyor. pH=5,7'de ise herhangi bir kutuba göç etmiyor.
- Bu amino asitin izoelektrik nokta (pI) değeri aşağıdakilerden hangisidir?**
- A) 4,7 B) 5,7 C) 6,5 D) 7,4 E) 8,3
43. Aşağıdakilerden hangisi, insanlarda bulunmadığı için askorbik asit sentezi gerçekleşemez?
- A) Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz
B) Pirüvat kinaz
C) L-gulonolakton oksidaz
D) Glutasyon redüktaz
E) Glutasyon peroksidaz
44. Aşağıdakilerden hangisi hem kolesterol hem de keton cisimciklerinin biyosentezinde yer alır?
- A) β -hidroksi- β -metilglutaril-KoA
B) İzopentenil pirofosfat
C) β -hidroksibütirat
D) Skualen
E) Farnezil pirofosfat
45. Aşağıdakilerden hangisi amfipatik lipid grubuna girmez?
- A) Yağ asitleri
B) Triasilgliserol
C) Sfingolipitler
D) Fosfolipitler
E) Kolesterol
46. Plazma membranındaki proteinlere, lipidlerin kovalent olarak bağlanmasını sağlayan posttranslasyonel modifikasyon aşağıdakilerden hangisidir?
- A) ADP-ribozilasyon
B) Asetilasyon
C) Metilasyon
D) γ -karboksilasyon
E) Prenilasyon
47. Konjenital adrenal hiperplazinin en az görülen ancak tüm steroid hormonlarda eksiklikle seyreden en ağır formu aşağıdaki defektlerden hangisi sonucunda ortaya çıkar?
- A) 21-hidroksilaz defekti
B) 11 β -hidroksilaz defekti
C) Steroidogenik akut düzenleyici protein (StAR) defekti
D) 17 α -hidroksilaz defekti
E) 3 β -hidroksisteroit dehidrojenaz defekti
48. Aşağıdakilerden hangisi intrasellüler sinyal iletiminde görev alan bir fosfolipittir?
- A) Fosfatidilserin
B) Fosfatidiletanolamin
C) Fosfatidilkolin
D) Fosfatidilinozitol
E) Difosfatidilgliserol
49. Aşağıdakilerden hangisi, kollajenin ekstrasellüler alandaki modifikasyonudur?
- A) Sinyal peptit ayrılması
B) Prolil hidroksilasyonu
C) Glikozilasyon
D) N ve C terminal propeptitlerin ayrılması
E) Üçlü sarmal oluşumu

TUSDATA
TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Şampiyonların Ders Notu



TUS Eylül 2021'de Tam 57 soruya referans verdi

Orijinal sorular ve kanıta dayalı görüntülü net referanslar için:
www.tusdata.com

Eylül 2021 TUS Sınavında

ÜÇ BÜYÜK İLDE DEĞİLDİ İLE TUS 6.SI OLDU!

TUSDATA
TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



MUSTAFA TALHA OKUTAN
T.Puan : 77,307
K.Puan: 77,987

KONYA NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ



KONYA ŞUBE

Detaylı bilgi için: www.tusdata.com

50. Lökositlerin fagositozunda; "X" enzimi ile süperoksit radikal anyonu, "Y" enzimi ile hipokloröz asit oluşur.

"X" ve "Y" ile gösterilen enzimler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

X	Y
A) NADH dehidrojenaz	Miyeloperoksidaz
B) NADPH oksidaz	Miyeloperoksidaz
C) Süperoksit dismutaz	Miyeloperoksidaz
D) Miyeloperoksidaz	Süperoksit dismutaz
E) NADPH oksidaz	NADH dehidrojenaz

51. Bazı proteinlerin yapısında yer alan glutamik asitin γ karbon atomu, posttranslasyonel modifikasyon ile karboksilasyona uğrar.

Aşağıdaki proteinlerden hangisi γ-karboksilat grubu içermez?

- A) Osteokalsin
- B) Protein S
- C) Faktör II
- D) Faktör X
- E) Fibrinojen

52. Aşağıdaki tümör belirteçlerinden hangisinin tarama amacı ile kullanılması en uygundur?

- A) Kalsitonin
- B) Laktat dehidrojenaz 1
- C) CA19-9
- D) HER-2/neu
- E) Prostat spesifik antijen

53. Gözlerinde sararma ve halsizlik şikâyetleri ile başvuran 23 yaşındaki kadın hastanın bir haftadır aralıklı açlık diyetini uyguladığı öğreniliyor. Fizik muayenesinde, skleralarda hafif sarılık tespit ediliyor. Laboratuvar sonuçlarında açlık kan glukozu 65 mg/dL, ALT, AST, ALP ve LDH enzimleri referans aralıkları, total bilirubin 2,5 mg/dL, direkt bilirubin 0,2 mg/dL, idrarda bilirubin negatif ve ürobilinojen normal olarak saptanıyor.

Bu hastada bilirubin artışına yol açan defekt aşağıdakilerin hangisinde görülür?

- A) Spektrin
- B) Biliverdin redüktaz
- C) UDP-glukuroniltransferaz
- D) Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz
- E) ABCC2 taşıyıcı

54. B12 vitamini ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Üç meten köprüsü ve bir tek bağ ile birleşen dört piro halkasından oluşan korrin halka sistemini içerir.
- B) Yapısında bulunan kobalt atomu en fazla dört bağ yapabilir.
- C) İntrensek faktör-kobalamin kompleksi, ileumdaki reseptörüne bağlanır.
- D) Transkobalamin II-B12 kompleksi, reseptör aracılı endositozla hücre içine alınır.
- E) Pankreatik yetmezlikte ve atrofik gastritte B12 vitamini eksikliği gelişebilir.

55. Anaerobik idrar yolu enfeksiyonundan şüphelenilen bir hastada etkenin üretilebilmesi için aşağıdaki klinik örneklerden hangisinin laboratuvara gönderilmesi en uygundur?

- A) Suprapubik aspirasyon örneği
- B) Orta akım idrar örneği
- C) Üriner kateter ile alınmış idrar örneği
- D) Üriner kateter ucu örneği
- E) İdrar torbasından alınan örnek

56. Mikrobiyoloji laboratuvarında ısıdan etkilenen sıvı besiyerlerinin hazırlanmasında kullanılan sterilizasyon yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ultraviyole
- B) Filtrasyon
- C) Etilen oksit
- D) Kuru ısı
- E) Otoklav

57. Aşağıdaki bakteri türleri ve bu bakteri türlerinin intrinsik olarak dirençli oldukları antibiyotik eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

- A) Pseudomonas aeruginosa – Sefepim
- B) Enterococcus faecium – Vankomisin
- C) Stenotrophomonas maltophilia – Trimetoprim sulfametoksazol
- D) Klebsiella pneumoniae – Ampisilin
- E) Staphylococcus aureus – Metisilin




58. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin klinik örnekten ilk izolasyonunda üretilebilmesi için besiyerinde mutlaka sistein bulunmalıdır?

- A) Brucella melitensis
- B) Haemophilus influenzae
- C) Neisseria gonorrhoeae
- D) Listeria monocytogenes
- E) Francisella tularensis

59. Kan kültüründe aşağıdaki bakterilerden hangisinin üremesi durumunda hastanın karbapenem grubu antibiyotikle tedavi edilmesi uygundur?

- A) Stenotrophomonas maltophilia
- B) Metisilin dirençli Staphylococcus aureus
- C) Vankomisin dirençli Enterococcus faecium
- D) Chryseobacterium indologenes
- E) Bacteroides fragilis





60. Bakteriyel vajinozise neden olabilen ve gram-pozitif olduğu hâlde Gram boyamada gram-negatif veya gram-değişken kıvrık basiller olarak görülen, zorunlu anaerop bakteri cinsi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Lactobacillus spp.
- B) Mobiluncus spp.
- C) Bifidobacterium spp.
- D) Actinomyces spp.
- E) Propionibacterium spp.

61. Aşağıdakilerden hangisi Staphylococcus aureus için seçici-ayrıt edici bir besiyeridir?

- A) Sabouraud dextrose agar
- B) MacConkey agar
- C) Lowenstein-Jensen agar
- D) Mannitol tuz agar
- E) Sistin tellürit agar

62. Sekiz yaşındaki kız çocuğu, iki gün önce göğsünden başlayıp ekstremitelerine yayılan eritematöz döküntü nedeniyle getiriliyor. Öyküsünden birkaç gündür boğaz ağrısı yakınması olduğu öğrenilen hastanın fizik muayenesinde döküntülerin eklem yerlerinde çizgi hâlini aldığı; ağız çevresi, avuç içi ve ayak tabanında herhangi bir döküntü olmadığı saptanıyor.

Bu klinik tabloya yol açması en olası etkene ait sorumlu virülans faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pirojenik ekzotoksin
- B) Hemolizin
- C) Hiyaluronidaz
- D) Deoksiribonükleaz
- E) Streptokinaz

63. İndirekt Coombs testinin aşağıdaki etkenlerden hangisinin serolojik tanısında kullanılması en uygundur?

- A) Legionella spp.
- B) Mycoplasma spp.
- C) Brucella spp.
- D) Listeria spp.
- E) Salmonella spp.

64. Aşağıdaki viruslardan hangisi kan yoluyla bulaşmaz?

- A) Zikavirus
- B) Sitomegalovirus
- C) Hepatit D virusu
- D) Epstein-Barr virus
- E) Human T-cell lymphotropic virüs 1

65. Aşağıdaki virüslerden hangisi insanlara primer olarak artropod vektörler aracılığıyla bulaşır?

- A) Arenavirus
- B) Calicivirus
- C) Bunyavirus
- D) Picornavirus
- E) Parvovirus

66. Epstein-Barr virüs enfeksiyonunda, atipik lenfositler olarak görülen en olası aktive T hücreleri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Cowdry A cisimcikleri
- B) İnklüzyon cisimcikleri
- C) Negri cisimcikleri
- D) Downey cisimcikleri
- E) Tzanck hücreleri

67. Ekzantem subitum'un etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) HHV-1
- B) HHV-2
- C) HHV-5
- D) HHV-6
- E) HHV-8

68. Sporangiyospor hangi mantar cinsi için karakteristik eşeysiz üreme yapısıdır?

- A) Rhizopus
- B) Aspergillus
- C) Scedosporium
- D) Fusarium
- E) Penicillium

69. Aşağıdakilerden hangisinin enfekte dokudan alınan biyopsi materyalindeki mikroskopik görünümünün, ana hücreye geniş bir boyunla bağlı ve kopmadan ana hücrenin büyüklüğüne ulaşabilen tomurcuk yapısı şeklinde olması en olasıdır?

- A) Blastomyces dermatitidis
- B) Coccidioides immitis
- C) Histoplasma capsulatum
- D) Paracoccidioides brasiliensis
- E) Talaromyces (Penicillium) marneffe

70. Aşağıdakilerden hangisi Candida albicans'a ait bir virülans faktörü değildir?

- A) 37 °C'de üreme
- B) Gerçek hif oluşturabilme
- C) Proteaz
- D) Melanin
- E) Dokuya adherens

TUSDATA
TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Şampiyonların Ders Notu



TUS
Eylül 2021'de
Tam
67
soruya referans
verdi

Orijinal sorular ve kanıta dayalı görüntülü net referanslar için:
www.tusdata.com

71. Aşağıdakilerden hangisi sestodların özelliklerinden değildir?

- A) Erişkinleri segmentli yapıdadır.
- B) Erişkinleri hermafrodittir.
- C) Erişkinlerinin transvers kesitleri yuvarlaktır.
- D) Genellikle yumurtalarında çengeller vardır.
- E) Erişkinlerinin sindirim sistemi yoktur.

72. Aşağıdaki protozoon tür ve evrim şekillerinden hangisinin tanımlanması için nativ preparat çoğunlukla yeterli değildir?

- A) *Giardia lamblia* trofozoiti
- B) *Giardia lamblia* kisti
- C) *Cystoisospora belli* ookisti
- D) *Entamoeba coli* kisti
- E) *Entamoeba histolytica* trofozoiti

73. Toy T-lenfositleri uyarak aktive etmede en başarılı antijen sunucu hücre aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Makrofaj
- B) Dendritik hücre
- C) B lenfosit
- D) Nötrofil
- E) Fibroblast

74. Aşağıdaki bakterilerden hangisine karşı korunma sağlamak amacıyla üretilen aşı, polisakkarit aşısıdır?

- A) *Corynebacterium diphtheriae*
- B) *Clostridium tetani*
- C) *Bordetella pertussis*
- D) *Neisseria meningitidis*
- E) *Mycobacterium tuberculosis*

75. Aşağıdaki bağlanmalardan hangisi kompleman yolağını alternatif yoldan aktive eder?

- A) C1'in antijen-antikör kompleksine bağlanması
- B) C1q'nun dolaşımdaki serbest antikörlere bağlanması
- C) C3b'nin mikroorganizmanın yüzeyine bağlanması
- D) Properdinin mikroorganizma yüzeyine bağlanması
- E) Mikroorganizma polisakkaritlerinin fikoline bağlanması

76. Aşağıdaki enfeksiyon etkenlerinden hangisinin damlacık yolu ile bulaşması en az olasıdır?

- A) Adenovirus
- B) SARS-CoV
- C) İnfluenza virus
- D) Norovirus
- E) Parvovirus B19

77. Aşağıdakilerden hangisi intrinsik ve ekstrinsik apoptoz yolları için ortaktır?

- A) Bcl-2
- B) Kaspaz 3
- C) Fas
- D) Bax
- E) TNF-R1

78. Akut inflamasyon sürecinde, nötrofillerin damarendoteline adezyonunu sağlayan maddelerin etkinleşmesinde en önemli rolü oynayan moleküller aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) IL-1, TNF-alfa
- B) IL-8, IL-10
- C) IL-2, IL-12
- D) Lipoksin, prostasiklin
- E) TGF-beta, EGF

79. Bir dağcı 4500 metre yüksekliğe hızlı bir tırmanma sonrasında önce güçsüzlük, solunum sıkıntısı ve baş ağrısı, daha sonra giderek artan oryantasyon bozukluğu ve bilinç kaybı yaşıyor.

Bu olguda aşağıdakilerden hangisi en olasıdır?

- A) Subdural hematom
- B) Arteriyel hava embolisi
- C) Serebral ödem
- D) Pulmoner tromboemboli
- E) İntraserebral hemoraji

80. Dört yaşında kız çocuk abdomende kitleyle getiriliyor. Kitlenin histopatolojik incelemesinde blastem özellikle selüler alanlar, gevşek stromal alanlar ve tübül benzeri yapılar görülüyor. Kromozom 11'in 11p15.5 bandında (WT2) genetik hata saptanıyor.


Bu hastada aşağıdakilerden hangisinin saptanması en olasıdır?

- A) Aniridi
- B) At nalı böbrek
- C) Anormal gonadal gelişim
- D) Glomerüler mezengial skleroz
- E) Adrenal sitomegali

81. Öyküsünde bilinen herhangi bir hastalığı olmayan 74 yaşındaki erkek hastanın bacak derisinde izlenen mor renkli maküller lezyondan alınan biyopside dilate, düzensiz şekilli ve açılı, sayıca artmış damar yapıları izleniyor. Stromada inflamatuvar hücreler, ekstrasöz eritrositler ve hemosiderin pigmenti görülüyor.

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Basiller anjiyomatozis
- B) Kaposi sarkomu
- C) Hemanjiyoperisitom
- D) Anjiyosarkom
- E) Hemanjiyodotelyoma



82. Aşağıdaki akciğer kanserlerinin hangisinde yaygın nekroz görülmesi en olasıdır?

- A) Karsinoid tümör
- B) Küçük hücreli karsinom
- C) Skuamöz hücreli karsinom
- D) Müsinöz adenokarsinom
- E) Papiller karsinom

83.

- I. Periferel zonda gelişen nodüller ile karakterizedir.
- II. Proliferasiyondan sorumlu başlıca hormonal stimulus dihidrotestosterondur.
- III. Epitel hücrelerinde proliferasyon yaygınken stromal hücrelerde genellikle proliferasyon görülmez.

Benign prostat hiperplazisi ile ilgili yukardaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) II ve III

84. Renal fonksiyon bozukluğu saptanan 13 yaşındaki erkek çocuğun idrar analizinde mikroskopik hematüri görülüyor. Dayısının 5 yıldır diyalize girdiği öğrenilen hastanın böbrek biyopsisinin elektron mikroskopik incelemesinde, glomerüler bazal membranlarda düzensiz kalınlaşma ve incelmeler, lamina densada sıklıkla sepet örgüsü görünümüne yol açan laminasyon ve ayrılmalar (splitting) dikkati çekiyor. İmmün kompleks depolanması saptanmıyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Alport sendromu
- B) Juvenil nefronofitizis
- C) IgA nefropatisi
- D) Reflü nefropatisi
- E) Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı

85. Hatalı tamir genlerinde inaktivasyon ve PTEN süpresör gen kaybı aşağıdaki endometrium kanser tiplerinin hangisinin gelişiminde daha sık rol oynar?

- A) Endometrioid adenokarsinom
- B) Şeffaf hücreli karsinom
- C) Seröz karsinom
- D) Müsinöz karsinom
- E) Karsinosarkom

86. Aşağıdaki meme kanserlerinden hangisinde, lenfositik doku reaksiyonu daha yoğun olup desmoplazinin azlığı nedeniyle yumuşak kıvamlı kitle görülmesi en olasıdır?

- A) Müsinöz karsinom
- B) Papiller karsinom
- C) Medüller karsinom
- D) Duktal karsinoma in-situ
- E) Tübüler karsinom

87. Feokromasitoma ve renal hücreli karsinom birlikteliği olan 43 yaşındaki hastada aşağıdaki tümörlerden hangisinin bunlara eşlik etmesi en olasıdır?

- A) Serebellar hemanjiyoblastom
- B) Serebellar polikistik astrositom
- C) Optik sinir gliomu
- D) Tiroid papiller karsinomu
- E) Kolon adenokarsinomu

88. Kırk beş yaşındaki kadın hasta; ağız içinde yaralar, sağ deride ve gövdede kolayca soyulan veziküller ve büller nedeniyle başvuruyor. Serolojik incelemede anti-desmoglein 3 pozitifliği tespit ediliyor. Deri biyopsisinde, epidermis içinde suprabazal ayrılma ile karakterli vezikül gelişimi saptanıyor. Direkt immünfloresan incelemede, epidermiste ağ şeklinde IgG ve C3 birikimi görülüyor.

Bu hastadaki veziküllerin gelişimi aşağıdakilerden hangisiyle en çok ilişkilidir?

- A) Akantoliz
- B) Diskeratoz
- C) Akantoz
- D) Hiperkeratoz
- E) Erozyon

89. Altmış iki yaşındaki erkek hasta, sağ dizinde bir haftadır süren şişlik ve ağrı şikâyetiyle başvuruyor. Hastadan alınan sinoviyal sıvı aspirasyon örneğinin polarize ışık mikroskopisinde aşağıdaki kristaloid birikimler görülüyor.



Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Romatoid artrit
- B) Osteoartrit
- C) Gut artrit
- D) Septik artrit
- E) Kalsiyum pirofosfat birikimi

90. Genç yaşından itibaren devam eden, ataklarla seyreden nörolojik semptomları ve görme bozukluğu şikâyetleri olan erişkin kadın hastanın MR görüntülemesinde beyaz cevherde lateral ventrikül çevresinde difüz kontrast madde tutulumu gösteren lezyonlar izleniyor.

Bu hastalıkta beyaz cevherde izlenen lezyonların patogenezinin sorumlu en olası hücre tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) B lenfositler
- B) Atipik glial hücreler
- C) Kırmızı nöronlar
- D) T lenfositler
- E) Plazma hücreleri

91. Dört yıl önce mide kanseri nedeniyle total gastrektomi yapılan 75 yaşındaki kadın hasta, hâlsizlik ve denge kaybı nedeniyle getiriliyor. Klinik muayenede, vibrasyon ve pozisyon duyusunda belirgin azalma ve derin tendon reflekslerinde artma izleniyor. Laboratuvar incelemesinde megaloblastik anemi ve pansitopeni saptanıyor.

Bu hastada aşağıdaki vitaminlerden hangisinin eksikliği en olasıdır?

- A) Retinoik asit
- B) Kobalamin
- C) Niasin
- D) Tiamin
- E) Riboflavin

92.

- I. Multiple miyelom – AA
- II. Hemodiyaliz ilişkili amiloidoz – Beta₂ mikroglobulin
- III. Ailesel akdeniz ateşi – AL
- IV. Ailesel amiloidotik nöropatiler – Transtiretin
- V. Sistemik senil amiloidoz – Transtiretin

Amiloid birikimiyle karakterize hastalıklar ve ilişkili proteinler ile ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

- A) I, II ve III
- B) I, II ve IV
- C) I, III ve V
- D) II, IV ve V
- E) III, IV ve V

93. Romatizmal kalp hastalığının patogenezi aşağıdakilerden hangisiyle en çok ilişkilidir?

- A) Santral tolerans kaybı
- B) HLA-B27 ekspresyonu
- C) Moleküler benzeşim
- D) Periferik tolerans kaybı
- E) Alerjinin bozulması

94. Aşağıdaki ifadelerden hangisi anaplaziyi en iyi tanımlar?

- A) Fonksiyonel benzerlik
- B) Proliferatif aktivite
- C) Metaplastik değişim
- D) Korunmuş polarite
- E) Farklılaşma kaybı

95. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde splenomegali görülmesi en az olasıdır?

- A) Karaciğer sirozu
- B) Miyelodisplastik sendrom
- C) Enfeksiyöz mononükleozis
- D) Gaucher hastalığı
- E) "Hairy cell" lösemi

96. Gastrointestinal kanalda aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha sık görülür?

- A) Marjinal zon lenfoma
- B) Mantle hücreli lenfoma
- C) Folliküler lenfoma
- D) Burkitt lenfoma
- E) Enteropati-ilikili intestinal T hücreli lenfoma

97. Larinks karsinomları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Skuamöz hücreli karsinom en sık rastlanan histopatolojik tiptir.
- B) Subglottik lokalizasyon en sık yerleşim yeridir.
- C) Sigara ve alkol tüketimi önemli risk faktörlerindendir.
- D) 40 yaş ve üzerinde daha sık olarak görülür.
- E) Sıklığı akciğer karsinomuna göre daha düşüktür.

98. Aşağıdakilerden hangisi ekstrahepatik biliyer obstrüksiyon nedenlerinden biri değildir?

- A) Safra taşları
- B) Pankreatik karsinom
- C) Primer biliyer kolanjit
- D) Konjenital biliyer atrezi
- E) Ampulla Vateri karsinomu

Eylül 2021 TUS

FAKÜLTE DERECESESİ (İLK 3'te) DEĞİLDİ

TUSDATA ile **TUS 1.'si oldu!**

Dr. Onat GÜNER

T.Puan : 80,204

K.Puan: 79,519

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ


ANKARA ŞUBE

Yeni mezun veya intörn olup ilk 3 içinde olanlar fakülte derecesi kabul edilmektedir.

Detaylı bilgi için: www.tusdata.com



TUS ve YDUS için VAKA SORULARI



YAKINDA



TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

SATIN ALMAK İÇİN: www.klinisyen.com

7/24



Dilediğin
zaman ve
dilediğin kadar
SEYRET

All In One Sınırsız ONLINE EĞİTİM



1. Her Yönüyle
TUS Danışmanlığı

2. **TUS Spotlar** ile
Haftaya Hazırlık

3. Temel ve Klinik
Online Konu Eğitimleri
(Online için tam ve özel çekimler)

4. **Update Notlar** ve
Update Videolar

5. **Entegre Dersler**
Videoları

6. **Vaka Kampı** Videoları

7. Son 10 Yılın
TUS Soru Çözüm
Videoları

8. Her Ders İçin
41 Adet Deneme ve
Çözüm Videoları

9. Son Üç Yıl **TUSDATA**
Deneme Çözüm Videoları

10. Her Branş İçin
Toplu Soru Çözüm
Videoları

11. **Tıp - Dil** Hazırlık
Eğitim Videoları

12. **TUS Ekstralar**

Videolarda Hocalarımızın Detaylı Analizleriyle

36.375 Soru

www.tusdata.com

99. Aşağıdaki antiepileptik ilaçlardan hangisi kendi metabolizmasını indükler?

- A) Fenitoin
- B) Karbamazepin
- C) Vigabatrin
- D) Tiagabin
- E) Gabapentin

100. Aşağıdaki muskarinik reseptör agonistlerinden hangisi postoperatif ileus, nörojenik ileus ve idrar retansiyonu tedavisinde kullanılır?

- A) Metakolin
- B) Betanekol
- C) Karbakol
- D) Pilokarpin
- E) Sevimelin

101. Aşağıdaki beta adrenerjik reseptör blokörlerinden hangisinin oral biyoyararlanımı en düşüktür?

- A) Esmolol
- B) Penbutolol
- C) Pindolol
- D) Karvedilol
- E) Nebivolol

102. Organofosfatlı insektisitlerle oluşan zehirlenmelerde aşağıdakilerden hangisi görülmez?

- A) Salivasyon artışı
- B) Bradikardi
- C) Miyozis
- D) Bronkospazm
- E) Üriner retansiyon

103. Gastroözofagal reflü hastalığı (GERD) nedeniyle uzun süreli omeprazol kullanan 60 yaşındaki bir kadın hastada aşağıdaki yan etkilerden hangisinin görülmesi en az olasıdır?

- A) Akut interstisyel nefrit
- B) Clostridium diffilice gastroenteriti
- C) Kalça kırıkları
- D) B12 vitamin eksikliği
- E) Hipermağnezemi

104. Yaklaşık dört hafta önce depresyon tanısı nedeniyle paroksetin başlanan 42 yaşındaki erkek hasta, kontrol muayenesinde paroksetini dört haftadır düzenli kullandığını, depresif yakınmalarının düzeldiğini ancak son iki haftadır cinsel isteksizlik ve boşalamama yakınmalarının olduğunu ifade ediyor. Hastada paroksetinin kesilmesine ve başka bir ilaç kullanımına geçilmesine karar veriliyor.

Bu hasta için tekrar cinsel istek bozukluğu yaşama olasılığı göz önünde bulundurulduğunda seçilmesi gereken en uygun ajan aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Imipramin
- B) Sitalopram
- C) Venlafaksin
- D) Mirtazapin
- E) Fluvoksamin

105. Fluoksetin kullanan bir hastanın antidepresan tedavisinde değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, aşağıdaki ilaçlardan hangisinin kullanımına başlanmadan en az 14 gün önce fluoksetin tedavisi kesilmelidir?

- A) Sertralin
- B) Venlafaksin
- C) Maprotilin
- D) Mirtazapin
- E) Tranilspromin

106. Yirmi yaşındaki erkek hasta intihar amaçlı yüksek doz ilaç alımı nedeniyle acil servise getiriliyor. Ambulansta nöbet geçirdiği bildiriliyor. Fizik muayenesinde sinüs, taşikardi olan hastanın pupilleri midriyatik, cilt ve muköz membranları kuru saptanıyor. Karın muayenesinde glob vezikale görülüyor.

Bu hastada aşağıdaki gruplardan hangisine ait bir ilacın yüksek doz alımı en olasıdır?

- A) Benzodiazepin
- B) Opioid
- C) Selektif serotonin reuptake inhibitörü
- D) Sempatomimetik
- E) Antikolinergik

107. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, kronik ürtiker ve klasik tedavilere dirençli ağır astım tedavisinde kullanılabilir?

- A) Etanersept
- B) İnfliksımab
- C) Omalizumab
- D) Ustekinumab
- E) Alefasept

108.

- I. Ketorolak
- II. Parasetamol
- III. Seleksib

Yukarıdakilerden hangileri parenteral yolla da kullanılan bir analjeziktir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

109. Dislipidemi tedavisinde kullanılan ilaç ve bu ilacın plazma lipid düzeyleri üzerindeki etkisi ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

- A) Fibrik asit türevleri – Trigliserid düzeylerinde azalma
- B) Kolestipol – LDL kolesterol düzeylerinde azalma
- C) Niasin – HDL kolesterol düzeylerinde artma
- D) PCSK9 inhibitörleri – LDL kolesterol düzeylerinde azalma
- E) Omega-3 yağ asiti esterleri – Trigliserid düzeylerinde artma

110. Aşağıdakilerden hangisinde, özellikle yaşlı ve kardiyak komorbiditesi olan hastalarda, QT uzaması ve "Torsades de pointes" yapma riski bulunmaktadır?

- A) Ampisilin
B) Azitromisin
C) Seftriakson
D) Doksisisiklin
E) Amikasin

111. Aşağıdakilerden hangisi intravenöz yolla uygulanan bir antikoagülandır?

- A) Argatroban
B) Dabigatran
C) Tikagrelor
D) Edoksaban
E) Vorapaksar

112. Leishmaniasis tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılmaz?

- A) Sodyum stiboglukonat
B) Meglumin antimonat
C) Amfoterisin B
D) Miltefosin
E) Dapsone

113. Aşağıdaki antiviral ilaçlardan hangisi viral proteaz inhibitörüdür?

- A) Entekavir
B) Tenofovir
C) Nelfinavir
D) Elvitegravir
E) Nevirapin

114. Klorokin direncinin endemik olduğu bir bölgeye seyahat edecek bireylere sıtmadan korunma amacıyla aşağıdakilerden hangisinin kullanılması en uygundur?

- A) Doksisisiklin
B) Amikasin
C) Metronidazol
D) Eritromisin
E) Albendazol

115. Aşağıdaki kemoterapötiklerden hangisinin kardiyomiyopati oluşturma potansiyeli en fazladır?

- A) Paklitaksel
B) Epirubisin
C) Etoposid
D) Irinotekan
E) Eribulin

116.

- I. 5α-redüktaz enzimini inhibe eder.
II. Erkek tipi kellik tedavisinde kullanılır.
III. Androjen reseptörlerini antagonize eder.

Finasterid ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

117. Diyabetik tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaçlardan hangisine bağlı olarak ödem, kilo artışı, kalp yetersizliği ve kadınlarda kemik kırıklarında artış görülme olasılığı en yüksektir?

- A) Rosiglitazon
B) Sitagliptin
C) Eksenatid
D) Akarboz
E) Metformin

118. Metanol zehirlenmesi tedavisinde kullanılan fomepizol aşağıdaki enzimlerden hangisi inhibe ederek etki gösterir?

- A) Alkol dehidrogenaz
B) Aldehit dehidrogenaz
C) DOPA dekarboksilaz
D) Mikrozomal etanol okside edici sistem
E) Monoamin oksidaz

119. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi sirozun neden olduğu portal hipertansiyonlu hastalarda varis kanamasını önleyerek etki gösterir?

- A) Propranolol
B) Bosentan
C) Sildenafil
D) Enalapril
E) Kandesartan

120. Psöriyazisin topikal tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur?

- A) Kalsitriol
B) Prednizolon
C) Tazaroten
D) Imikvimod
E) Kalsipotrien

TUSDATA
TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

EYLÜL 2021 TUSDATA Farkı ile

Puan Arttıranlar

Dr. Cavidan TÜRKİYILMAZ

Bir önceki kazandığı sınav **Puan artışı 15.900** Bir sonraki kazandığı sınav

T. Puanı: 55.380
K. Puanı: 54.830

T. Puanı: 69.340
K. Puanı: 70.730

Eylül 2021 TUS Sınavında

ÜÇ BÜYÜK İLDE DEĞİLDİ

TUSDATA ile TUS 4.sü oldu!

GÖKHAN DOĞAN
T.Puan : 77,947
K.Puan: 77,906

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ

37 TUS
32
BİRİNCİ

GAZİANTEP ŞUBE

Detaylı bilgi için: www.tusdata.com

TUS EYLÜL 2021

KLİNİK BİLİMLER TESTİ

121. Ağır seyirli, nekrotizan bir cilt ve yumuşak doku enfeksiyonunda etken Staphylococcus aureus olarak saptanıyor.

Antibiyogram sonucu gelene kadar aşağıdaki antibiyotiklerden hangisinin kullanılması en uygundur?

- A) Aztreonam
- B) Piperasilin/tazobaktam
- C) Siprofloksasin
- D) Vankomisin
- E) Seftriakson

122. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, invaziv aspergilloz tedavisinde ilk seçenek olarak kullanılır?

- A) Kaspofungin
- B) Amfoterisin B
- C) Vorikonazol
- D) İtrakonazol
- E) Mikafungin

123. Menenjit düşünülen bir hastada, aşağıdaki bulgulardan hangisinin görülmesi en az olasıdır?

- A) Baş ağrısı
- B) Yüksek ateş
- C) Kusma
- D) Bilinç değişikliği
- E) Papil ödemi

124. T hücre defekti olan bir hastada aşağıdaki mikroorganizmaların hangisinden gelişen enfeksiyon riski diğerlerine göre daha yüksektir?

- A) Cryptococcus neoformans
- B) Giardia lamblia
- C) Burkholderia cepacia
- D) Hemophilus influenzae
- E) Histoplasma capsulatum

125. Kırk yedi yaşındaki erkek hastanın toraks bilgisayarlı tomografisinde, yama tarzı buzlu cam alanları ve alveolit ile uyumlu görünüm saptanıyor. İnterstiyel akciğer hastalığı düşünülerek yapılan tanısal bronkoskopiye alınan bronkoalveoler lavaj örneğinde belirgin eozinofili tespit ediliyor.

Bu hastadaki bulgular ile aşağıdakilerden hangisi dışlanabilir?

- A) Alerjik bronkopulmoner aspergillozis
- B) Löfller sendromu
- C) Churg-Strauss sendromu
- D) İlaça bağlı interstiyel pnömoni
- E) Silikozis

126. Aşağıdakilerden hangisi idiyopatik pulmoner fibrozis gelişiminde olası risk faktörlerinden biri değildir?

- A) İleri yaş
- B) Sigara öyküsü
- C) Çevresel veya mesleki maruziyet
- D) Erkek cinsiyet
- E) Astım

127. Merkezi havalandırma sistemi kullanılan bir iş yerinde çalışan 38 yaşındaki kadın hasta, bir haftadır süregelen kırılganlığa eklenen ateş, titreme, halsizlik, öksürük, uyku hâli, iştahsızlık ve kas ağrısı yakınmaları ile başvuruyor. Öyküsünden, bir hafta önce iş yerinde iki çalışanın daha aynı şikâyetlerle tedavi gördüğü öğreniliyor. Fizik muayenesinde, vücut sıcaklığı 39,2 °C ölçülüyor. Solunum sistemi oskültasyonunda bilateral seyrek ince raller duyuluyor. Laboratuvar testlerinde, lökosit 10.000/mm³, CRP 89 mg/dL, sedimentasyon hızı 110 mm/saat, sodyum 130 mmol/L, AST 86 U/L, ALT 72 U/L ve LDH 250 U/L olarak saptanıyor. Posteroanterior akciğer grafisinde bilateral yamalı infiltrasyonlar görülüyor.

Pnömoni tanısı alan bu hasta için en olası enfeksiyon etkeni ve en uygun antibiyotik eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Legionella pneumophila - Klaritromisin
- B) Respiratuvar sinsityal virus - Oseltamivir
- C) Mycoplasma pneumoniae - Amoksisilin klavulanat
- D) Klebsiella pneumoniae - Penisilin G
- E) Staphylococcus pneumoniae - Azitromisin

128. Aşağıdaki durumlardan hangisinde S1 şiddetinin azalması en az olasıdır?

- A) Beta blokör kullanımı
- B) Sol ventrikül sistolik disfonksiyonu
- C) Perikardiyal efüzyon
- D) Kısa PR
- E) Ciddi kalsifik mitral stenozu

129. Nefes darlığı ve kan basıncı yükselmesi şikâyetleriyle başvuran 65 yaşındaki kadın hastanın geçirilmiş koroner arter by-pass operasyonu dışında tıbbi öyküsünde özellik bulunmuyor. Fizik muayenesinde S3 duyuluyor. Aspirin dışında ilaç kullanmayan hastanın biyokimyasal tetkikleri normal tespit ediliyor. Ekokardiyografisinde ejeksiyon fraksiyonu %25 olan hastaya bir haftalık kan basıncı takibi sonucunda antihipertansif tedavi başlanmasına karar veriliyor.

Bu hastanın tedavisinde aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisinin tercih edilmesi en az uygundur?

- A) Mineralokortikoid reseptör antagonistleri
- B) Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü
- C) Diüretik
- D) Non-dihidropiridin kalsiyum kanal blokörü
- E) Anjiyotensin reseptör blokörü

130. Aşağıdakilerden hangisi kronik kalp yetmezliği olan bir hastada akut dekompanseasyona yol açan bir neden değildir?

- A) Kalp hızının 60-70/dakika arasına düşürülmesi
- B) Yüksek ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon
- C) Pulmoner enfeksiyon
- D) Miyokardiyal iskemi
- E) Hipertansif atak



İlk 100'de ama fakülte derecesiyle* mezun olmayan kursiyerlerimizin sayısı

*Yeni mezun (İlk sınavı) veya intern olup ilk 3 içinde olanlar fakülte derecesi kabul edilmiştir.

TUS
Eylül 2021'de
37
kursiyerimiz
fakülte derecesi
değildi

Adı Soyadı	Puan	Sıra
Onat GÜNER	79.519	1
Tanık DÜZENLİ	78.914	2
Mustafa Talha OKUTAN	77.987	6
Gençay KARANLIK	77.906	7
Burak YILDIZ	77.557	9
Furkan YILDIRIM	77.423	11
Berkay SERT	77.141	15
Mehmet M. HOROZ	76.576	19
Ali Mert GÖK	76.241	22
Onur Ege TARI	75.972	28
Enes ŞAHİN	75.972	29
Hasan DİKER	75.704	33
Kerem SAĞLAM	75.569	40
Hikmet KADIOĞLU	75.435	46
Deniz Berkay SONU	75.367	49
Fahrettin KÜÇÜKHEMEK	75.300	52
Onur ALTAŞ	75.287	54
Yavuz BEŞLİ	74.910	60
Utku Erdi SEMİZ	74.830	63

Adı Soyadı	Puan	Sıra
Umut BASAN	74.763	66
İhsan AKDAĞ	74.682	69
Said Furkan YILDIRIM	74.682	70
Salih ERKAN	73.659	70
Ali YİĞİT	74.629	73
Halil Barış BAŞARIR	74.628	74
Abdulrahman JAFAROV	74.620	75
Damla ERDAŞ	74.615	76
Şerife ALTUNBAY	74.024	78
Kadir Atacan YILDIZ	74.548	81
Arda SALTAŞ	74.534	82
Süleyman OPÇİN	74.494	83
Niyazi ÇETİN	74.427	84
Burak Tahir YAZAR	74.320	90
Eren Yavuz AÇIKALIN	74.225	93
Mustafa Alperen AYDENİZ	74.212	95
İpek TANYOLAÇ	74.185	96
Erdeniz ERIŞ	73.863	97

İlk 100'de ama üç büyük ilde olmayan kursiyerlerimizin sayısı

Adı Soyadı	Şube	Puan	Sıra
Tanık DÜZENLİ	DENİZLİ	78.914	2
Mustafa T. OKUTAN	KONYA	77.987	6
Gençay KARANLIK	BURSA	77.906	7
Gökhan DOĞAN	GAZİANTEP	77.906	7
Süleyman AYIK	ESKİŞEHİR	77.316	12
Hasan DİKER	KONYA	75.704	33
Emre BALCI	EDİRNE	75.569	41
Salim SANCAR	SAMSUN	74.763	65
Umut BASAN	MUĞLA	74.763	66
Halil Barış BAŞARIR	DENİZLİ	74.628	74
Abdulrahman JAFAROV	ERZURUM	74.620	75
Süleyman OPÇİN	ANTALYA	74.494	83
Niyazi ÇETİN	DENİZLİ	74.427	84
Mustafa A. AYDENİZ	MERSİN	74.212	95
Burak TOKAÇ	SAMSUN	74.110	98

TUS
Eylül 2021'de
15
kursiyerimiz
üç büyük ilde
değildi

131. Aşağıdakilerden hangisi kardiyak patolojisi olmayan bir hastada, posteroanterior göğüs röntgeninde kalbin sol mediastinal konturunu oluşturmaz?

- A) Aort topuzu
- B) Ana pulmoner arter
- C) Sol ventrikül
- D) Sol atrial apendiks
- E) Mitral kapak

132. Otuz bir yaşındaki kadın hasta 15 yaşından beri var olan ama son altı aydır şiddetlenen yutma güçlüğü ile başvuruyor. Öyküsünden, hastanın gece uykudan uyandıran regürjitasyon ve öksürük atakları, kötü ağız kokusu ve bir yılda 12 kg kilo kaybı olduğu öğreniliyor. Baryumlu özofagus grafisinde özofagus dilate olup içinde seviye veren artıklar ile özofagus distalinde kuş gagası şeklinde daralma saptanıyor.

Bu hastaya özofagus motilite çalışması uygulandığında aşağıdaki patolojik bulgulardan hangisinin saptanması en az olasıdır?

- A) Alt özofagus sfinkterinde basınç yüksekliği
- B) Alt özofagus sfinkterinde tam gevşeyememe
- C) Özofagus gövde peristaltizmi yokluğu
- D) Özofagus gövde peristaltizminde azalma
- E) Üst özofagus sfinkterinde tam gevşeyememe

133. Ülseratif pankolit tanısı ile izlenmekte olan 35 yaşındaki erkek hasta halsizlik, kaşıntı, sarılık, kilo kaybı yakınmaları ile polikliniğe başvuruyor. Yapılan tetkiklerde ALP'nin normalin üç katı, transaminazların iki katı yüksek olduğu tespit ediliyor.

Bu hastada en olası ön tanı ve istenmesi en uygun tetkik aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) Kolesistit - Ultrasonografi
- B) Koledokolithiazis - Ultrasonografi
- C) Primer sklerozan kolanjit – MR kolanjiyografi
- D) Otoimmün pankreatit - Kolanjiyografi
- E) Primer biliyer kolanjit – Karaciğer biyopsisi

134. Aşağıdakilerden hangisi **HFE** ilişkili **herediter hemokromatoza** yol açan **mutasyonlardan** biridir?

- A) HJV mutasyonu
- B) HPSidin mutasyonu
- C) TFR2 mutasyonu
- D) Ferroportin (SLC40A1) mutasyonu
- E) C282Y mutasyonu

135. Primer biliyer kolanjitte ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Kadınlarda daha yüksek oranda görülür.
- B) Birliktelik gösterdiği hastalıklar arasında skleroderma vardır.
- C) Birliktelik gösterdiği hastalıklar arasında Hashimoto tiroiditi vardır.
- D) Tedavide kortikosteroid kesilmesiyle hastalık nüks eder.
- E) İnatçı kaşıntılar nedeniyle karaciğer transplantasyonu yapılabilir

136. Elli beş yaşındaki erkek hasta; kilo alma, yemeklerden sonra halsizlik ve uyuklama yakınmalarıyla başvuruyor. Herhangi bir ilaç kullanmayan hastanın annesinde ve bir ablasında tip 2 diyabet olduğu öğreniliyor. Fizik muayenesinde kan basıncı 135/90 mmHg ve vücut kitle indeksi 29 kg/m² tespit ediliyor. Hastaya yapılan 75 g oral glukoz tolerans testinin (OGTT) sonuçları aşağıda verilmiştir.

	0. saat	2. saat
Glukoz (mg/dL)	98	160

Bu hastanın OGTT sonucunu en doğru şekilde tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bozulmuş açlık glukozu
- B) Bozulmuş glukoz toleransı
- C) Bozulmuş açlık glukozu ve toleransı
- D) Diabetes mellitus
- E) Normal OGTT

137. Infertilite nedeniyle araştırılmakta olan 27 yaşındaki kadın hastanın öyküsünden görme probleminin olmadığı öğreniliyor. Nörolojik muayenesi normal bulunan hastada hiperprolaktinemi ve hipofizde 15 mm çapında adenom ile uyumlu lezyon saptanıyor.

Bu hasta için öncelikli tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


- A) Oral kontraseptiflerle adetlerin düzenlenmesi
- B) Selektif östrojen reseptör modülatörleri ile meme kanseri riskinin engellenmesi
- C) Dopamin agonistleri ile tümörün küçültülmesi
- D) Transsfenoidal cerrahiyle tümörün çıkarılması
- E) Yardımcı üreme yöntemleriyle fertilitenin sağlanması

138. Cushing sendromu olan 43 yaşındaki kadın hastada, bilateral adrenalektomi sonrası hipofizde ACTH salgılayan adenom gelişiyor.

Bu hastada aşağıdaki durumlardan hangisi en olasıdır?

- A) Conn sendromu
- B) Nelson sendromu
- C) POEMS sendromu
- D) Turner sendromu
- E) Schmidt sendromu

139. Ateş ve bilinç bulanıklığı nedeniyle acil servise getirilen kadın hastada hemoglobin 9,5 g/dL, MCV 95 fL, trombosit 35.000/mm³ ve LDH 1.500 U/L bulunuyor. Periferik kan yayması aşağıda verilen hastanın koagülasyon testlerinde protrombin zamanı (PT), parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT), fibrinogen ve D-dimer düzeyi normal saptanıyor. Coombs testleri negatif bulunuyor.



Plazma değişimi yapacak uygun ekipmanın bulunmadığı bir hastanede, bu hasta için ilk yapılması gereken en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Desmopressin verilmesi
- B) Trombosit süspansiyonu verilmesi
- C) Taze donmuş plazma verilmesi
- D) Kriyopresipitat verilmesi
- E) Traneksamik asit verilmesi

140. Aşağıdaki laboratuvar testlerinden hangisinin hemolitik anemiler ile vitamin B12 eksikliğine bağlı anemiye birbirinden ayırt etmede yardımcı olması en olasıdır?

- A) Hemoglobin düzeyi
- B) Laktat dehidrogenaz düzeyi
- C) Retikülosit sayısı
- D) İndirekt bilirubin düzeyi
- E) Haptoglobin düzeyi

141. Nefes darlığı, çarpıntı, kolay yorulma yakınmaları ile başvuran 70 yaşındaki kadın hastanın efor kapasitesinde azalma saptanıyor. Öyküsünden, metastatik c-erbB2 (HER-2) pozitif meme kanseri tanısı ile adriamisin kullanmış olduğu ve uzun süredir trastuzumab uygulandığı öğreniliyor.

Tedavi ilişkili sorun düşünülen bu hastada gelişmiş en olası toksisite ve istenmesi gereken en uygun tetkik aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) Akciğer toksisitesi – Posteroanterior akciğer grafisi
- B) Miyelosupresyon – Tam kan sayımı
- C) Nöropati – Elektromiyografi
- D) Hepatotoksitesi – Karaciğer fonksiyon testleri
- E) Kardiyotoksitesi – Ekokardiyografi

142. Diyabetik ayak yüzeysel ve hafif enfeksiyonlarında kültürde en sık görülen mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Streptococcus pyogenes
- B) Mycobacterium tuberculosis
- C) Staphylococcus aureus
- D) Pseudomonas aeruginosa
- E) Streptococcus mitis

143. Beş yıldır astım tanısı ile takip edilmekte olan hasta yüksek doz inhale kortikosteroid (İKS) ve formoterol tedavisini düzenli olarak ve gerektiğinde semptom giderici olarak kullanıyor. Hastanın son kontrolünde bu tedavi altında son dört aydır yakınması olmadığı, astım kontrol testi değerinin 23 olduğu ve solunum sistemi muayenesinin normal olduğu görülüyor.

Bu hastanın tedavisinde aşağıdaki düzenlemelerden hangisinin yapılması en uygundur?

- A) Formoterol tedavisinin kesilmesi
- B) İKS dozunun %50 oranında azaltılması
- C) Formoterol dozunun %50 oranında azaltılması
- D) Formoterol kesilerek yerine uzun etkili antikolinerjik verilmesi
- E) İKS kesilerek yerine oral anti-lökotrien tedavisine başlanması

144. Kırk sekiz yaşındaki kadın hasta; ellerinde ciltte sertleşme, soğukluk ve parmak ucunda yara yakınmalarıyla başvuruyor. Öyküsünden; ellerinde uzun süredir soğukta önce beyazlaşma, ardından morarma ve sonra kızarma şeklinde renk değişikliği olduğu, son bir yıldır parmak derisinde sertleşme fark ettiği, bir ay önce parmak ucunda yara çıktığı ve halen yaranın kapanmadığı öğreniliyor.

Bu hastada en olası tanı için öncelikli olarak istenmesi gereken serolojik test aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Anti-sentromer
- B) Anti-dsDNA
- C) ANCA
- D) Anti-Ro (SS-A)
- E) Anti-kardiolipin

145.

- I. Romatoid artrit
- II. Psöriatik artrit
- III. Sistemik lupus eritematozus
- IV. Enteropatik artrit
- V. Reaktif artrit

Yukarıdaki hastalıkların hangilerinde HLA-B27 pozitifliği hastalık patogeneziyle ilişkilidir?

- A) I, II ve III
- B) I, III ve V
- C) I, IV ve V
- D) II, III ve IV
- E) II, IV ve V

146. Aşağıdakilerden hangisinin nefrotik sendrom tanısı konulan erişkin bir hastada izlenmesi beklenmez?

- A) Hipertansiyon
- B) 3,5 gram/gün üzerinde proteinüri
- C) İdrar sediment incelemesinde eritrosit
- D) Ödem
- E) Hipoalbuminemi

147. Aşağıdakilerin hangisinde idrar sedimentinin incelenmesinde dismorfik eritrositler ve eritrosit silendirleri saptanması en olasıdır?

- A) Akut tübüler nekroz
- B) İdrar yolu enfeksiyonu
- C) Akut nefritik sendrom
- D) Mesane kanseri
- E) Renal arter stenozu

148. Glomerüler bozuklukların göstergesi olarak genellikle aşağıdaki proteinlerden hangisinin idrardaki miktarı ölçülür?

- A) Sekretuar IgA
- B) Transferrin
- C) α1-antitripsin
- D) Albümin
- E) Prealbumin

149. Yaşlanmaya bağlı fizyolojik değişiklikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Nabız dalga hızı artar.
- B) Sol ventrikülün kütlesi artar.
- C) Karaciğer kan akımı ve kütlesi azalır.
- D) Karaciğer faz 1 ilaç metabolizması hızlanır.
- E) Akciğerlerde rezidüel volüm artar.

Eylül 2021 TUS Sınavında

ÜÇ BÜYÜK İLDE DEĞİLDİ

ile TUS 41.si oldu!



EMRE BALCI
T.Puan : 75,211
K.Puan: 75,569

EDİRNE TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ



EDİRNE ŞUBE

Detaylı bilgi için: www.tusdata.com

150. Aşağıdakilerden hangisi psöriazisin ayırıcı tanısında yer alan hastalıklardan değildir?

- A) Kutanoz T hücreli lenfoma B) Seboreik ekzema
C) Pitriazis rozea D) Sekonder sifiliz
E) Pemfigus vulgaris

151. Kırk yaşındaki kadın hasta, 5 yıldır yanaklarda, çenede ve burunda olan kızarıklık ve sivilcelenme şikayetleriyle başvuruyor. Öyküsünden acılı ve baharatlı yiyecekler, sıcak banyo ve güneş ile şikayetlerinin arttığı öğreniliyor. Hastanın dermatolojik muayenesinde bilateral malar bölgelerde, çenede ve burun üzerinde eritem, telenjektaziler ve püstüller gözleniyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Akne vulgaris B) Perioral dermatit
C) Diskoid lupus eritematozus D) Rozasea
E) Dermatomyozit

152. Altmış beş yaşındaki erkek hasta bacaklarda kuvvetsizlik, ağız kuruluğu ve kabızlık yakınmalarıyla başvuruyor. Küçük hücreli akciğer kanseri öyküsü olan hastanın muayenesinde alt ekstremitelerde proksimallerinde 4/5 kas gücü ve arefleksi saptanıyor.

Bu hastada mevcut klinik tabloyla ilişkili patofizyolojik mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Asetilkolinin presinaptik salımının bozulması
B) Voltaja hassas potasyum kanallarının azalması
C) Asetilkolin reseptör sayısının azalması
D) Voltaja hassas sodyum kanallarının blokajı
E) Klor kanallarının geçirgenliğinde artma

153. Aşağıdakilerden hangisi amiotrofik lateral sklerozun tipik olarak beklenen klinik bulgularından biri değildir?

- A) Diplopi B) Disfaji
C) Dizartri D) Fasikülasyon
E) Kas atrofisi

154. Hipertansiyonla ilişkili spontan intraserebral hemorajilerin en sık lokalizasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Oksipital lob B) Putamen
C) Serebellum D) Frontal lob
E) Pons

155. Ailesinin ısrarıyla doktora başvuran 30 yaşındaki erkek hastanın ergenlik yıllarından beri yakın arkadaşı olmadığı, genelde tek başına vakit geçirmeyi tercih ettiği, duygusal olarak mesafeli olduğu ve aile bireyleriyle fazla paylaşımı bulunmadığı öğreniliyor. Üniversite öğrenimini tamamlamış ve masabaşı bir işte uzun süredir düzenli çalışmakta olan hastanın başka herhangi bir hastalık belirtisi veya tedavi öyküsü bulunmuyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Şizofreniform bozukluk
B) Şizoid kişilik bozukluğu
C) Şizotipal kişilik bozukluğu
D) Paranoid kişilik bozukluğu
E) Şizofreni

156. Yirmi dört yaşındaki kadın hasta, kişiler arası ilişki sorunları yakınmasıyla başvuruyor. Öyküsünden; ergenlik sonrasında başlayarak sürekli ilgi ve dikkat odağında olma isteğini engelleyemediği, bulunduğu ortamlarda dikkatin odağında olmadığı rahatsızlık hissettiği, özel bir çaba harcamasa da insanların onu cinsel olarak cezbedici buldukları, bu durum hoşuna gitse de aslında cinselliğin ona çok uzak bir yaşantı olduğu, duygularında ani iniş çıkışları olduğu öğreniliyor. Görüşmede duygularını abartılı olarak ifade ettiği, fiziksel görünümüyle de dikkat çekmeye çalıştığı, teatral bir konuşma tarzı olduğu gözlenen hastada depresyon, anksiyete ya da başka psikiyatrik belirti olmadığı saptanıyor.

Bu hastadaki en olası kişilik bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Narsisistik kişilik bozukluğu
B) Borderline kişilik bozukluğu
C) Paranoid kişilik bozukluğu
D) Histriyonik kişilik bozukluğu
E) Antisosyal kişilik bozukluğu

157. Aşağıdaki periferik sinirlerin hangisindeki tuzaklanmanın lateral epikondilit benzeri bir klinik tabloya neden olması en olasıdır?

- A) Anterior interosseöz sinir
B) Posterior interosseöz sinir
C) Ulnar sinir
D) Lateral brakial kutanoz sinir
E) Muskulokutanoz sinir

158. Demografik dönüşüm süreciyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İlk aşamada ölüm ve doğum hızları yüksek, nüfus artış hızı yavaştır.
B) Son aşamada toplam doğurganlık hızı ikinin altına düşebilir.
C) Pandemilerin azalması ile eş zamanlı olarak doğumlar da azalır.
D) İlk aşama, sanayi öncesi dönemi tanımlar.
E) Ölümlerin azalmasındaki temel belirleyici, düzelen çevre ve yaşam koşullarıdır.

159. Aşağıdakilerden hangisinin metanol intoksikasyonu tedavisinde yeri yoktur?

- A) Hemodiyaliz B) Fomepizol
C) Etanol D) Mide yıkama
E) Folik asit

160. Aşağıdakilerden hangisi nabızsız elektriksel aktivite nedeni değildir?

- A) Hipoksi B) Hiperglisemi
C) Hiperpotasemi D) Tansiyon pnömotoraks
E) Toksinler

161. Otuz beş yaşındaki kadın hasta, üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası sinirlilik, kilo kaybı ve taşikardi şikayetleri ile başvuruyor. TSH değeri 0,02 mU/L (0,4-4,5) olan hastaya Tc-99m perteknetat tiroid sintigrafisi ve radyoaktif iyot (I-131) tiroid tutulum testi yapılıyor.

Aşağıda sonuçları verilen sintigrafik bulgulardan hangisi, bu hastada subakut tiroidit tanısını düşündürür?

- | Tc-99m | I-131 |
|---------------|-----------------|
| A) Hiperaktif | Artmış tutulum |
| B) Hiperaktif | Azalmış tutulum |
| C) Suprese | Artmış tutulum |
| D) Suprese | Azalmış tutulum |
| E) Hiperaktif | Normal tutulum |

162. Kırk yaşındaki erkek hasta künt batin travması ile acil servise başvuruyor. Hastanın hemodinamik olarak stabil olduğu ancak bilinç bulanıklığı nedeniyle fizik muayene bulgularının güvenilir olmadığı düşünülüyor. Hasta başında yapılan ultrasonografik incelemede, hastada intraabdominal serbest sıvı izleniyor.

Bu hastanın ultrasonografi sonrası abdominal bölgeye yönelik tanısal değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisinin tercih edilmesi en uygundur?

- A) Direkt radyografi
- B) Renkli Doppler ultrasonografi
- C) İntravenöz kontrastlı bilgisayarlı tomografi
- D) Manyetik rezonans görüntüleme
- E) Sintigrafi

163. Ağır kombine immün yetmezlik tanısı olan bir çocukta aşağıdaki aşılarından hangisi uygulanamaz?

- A) Hepatit A aşısı
- B) Suçiçeği aşısı
- C) Konjuge pnömokok aşısı
- D) Hepatit B aşısı
- E) İnaktif polio aşısı

164. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde çocukluk çağında kemik tutulumu görülmesi en az olasıdır?

- A) Majeed sendromu
- B) Kronik rekürren multifokal osteomyelit
- C) Ailesel Akdeniz ateşi
- D) Cherubism
- E) IL-1 reseptör antagonist eksikliği

165. Altı saat önce vakum yardımı ile doğurtulan 41 haftalık bir yenidoğanın fizik muayenesinde hipotonisite, solukluk ve kulaklarının her ikisinin de öne doğru dönük olduğu tespit ediliyor. Hemoglobin değeri 7 g/dL olarak saptanıyor.

Bu hastada en olası kraniyal kanama tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Subgaleal
- B) Subdural
- C) Epidural
- D) Sefal hematom
- E) İntraventriküler

166. Beş aylık erkek bebek üç aydır yetersiz kilo artışı, kusma, huzursuzluk ve özellikle gece olan ateş atakları nedenleriyle getiriliyor. Fizik muayenesinde boyunun üçüncü persentilde ve vücut ağırlığının üçüncü persentilin altında olduğu saptanıyor. Laboratuvar incelemelerinde; idrar dansitesi 1005, idrar sedimenti normal, serum sodyumu 155 mEq/L (134-144), potasyumu 4,1 mEq/L (3,5-5,6), kloru 111 mEq/L (98-106), kan üre azotu 13 mg/dL (5-18), kreatinini 0,35 mg/dL (0,03-0,50), ürik asiti 8 mg/dL (1,8-5,0), idrar osmolalitesi 120 mOsm/kg, kan osmolalitesi 310 mOsm/kg olarak saptanıyor.

Bu hastadaki en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bartter sendromu
- B) Uygunsuz ADH sendromu
- C) Gastroözofageal reflü
- D) Diabetes insipidus
- E) Kistik fibrozis

167. Çocukluk çağında, parmak uçlarından nekroz ile başlayan dijital ülserin aşağıdaki hastalıkların hangisinde görülmesi en olasıdır?

- A) Progresif sistemik skleroz
- B) Mevalonat kinaz eksikliği
- C) TNF reseptörü ile ilişkili sendrom
- D) Kriyoprinopatiler
- E) Blau sendromu

168. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda normalden büyük fontanel nedenlerinden biri değildir?

- A) Hipofosfatazya
- B) Konjenital rubella
- C) Osteogenezis imperfekta
- D) Hipertiroidizm
- E) Piknodizostozis

169. Sünnet esnasında uygulanan prilokaine bağlı methemoglobinemi gelişen 7 yaşındaki çocuğa tedavi amacıyla metilen mavisi veriliyor. Tedavi sonrasında hastada nonimmün hemolitik anemi gelişiyor.

Aşağıdakilerden hangisinin varlığı bu hastadaki tablonun en olası nedenidir?

- A) Pirüvat kinaz eksikliği
- B) Pirimidin-5'-nükleotidaz eksikliği
- C) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği
- D) Hereditör sferositoz
- E) Orak hücreli anemi

170. Aşağıdakilerden hangisinin çocuklarda hızlı ardışık entübasyonda sedatif olarak ketamin kullanımında görülmesi en az olasıdır?

- A) Kan basıncının artması
- B) Bronkodilatasyon
- C) Halüsinasyon
- D) Hava yolu sekresyonlarının artması
- E) Bradikardi

171. Çocuk yoğun bakımda izlenmekte olan 6 yaşındaki bir kız çocuk genel durumunun aniden kötüleşmesi nedeniyle değerlendiriliyor. Hastada nabızsız elektriksel aktivite olduğu tespit ediliyor.

Bu hastanın kardiyopulmoner resüsitasyonunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olmaz?

- A) Göğüs kompresyonu
- B) Balon maske ile ventilasyon
- C) Defibrilasyon
- D) Epinefrin
- E) Damar yolu açılması

Eylül 2021 TUS

FAKÜLTE DERECESESİ (İLK 3'te) DEĞİLDİ

TUS 7.'si oldu!

Dr. Burak YILDIZ

T.Puan : 77,780

K.Puan: 77,557

DEMİROĞLU BİLİM TIP FAKÜLTESİ

HASEKİ

Yeni mezun veya İntörn olup İlk 3 içinde olanlar fakülte derecesi kabul edilmektedir.

Detaylı bilgi için: www.tusdata.com

172.

- I. İlaçlar bu yol ile verilemez.
- II. Kan ürünü transfüzyonu yapılamaz.
- III. Sıklıkla proksimal tibiya yerleştirilir.
- IV. Kardiyopulmoner resüsitasyon sırasında kullanılabilir.

Çocuklarda intraosseöz uygulamalar ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) III ve IV
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

173. Aşağıdaki viruslardan hangisi çocuklarda hemorajik ateş nedenidir?

- A) Chikungunya virusu
- B) Batı Nil virusu
- C) Japon ensefalit virusu
- D) Tick-Borne ensefalit virusu
- E) Dengue virusu

174. Aşağıdakilerden hangisinde çocuklarda hemolitik üremik sendrom gelişme riski en düşüktür?

- A) *Salmonella* spp.
- B) *Camphyllobacter* spp.
- C) Enterotoksijenik *E. coli*
- D) *Shigella* spp.
- E) *Aeromonas* spp.

175. Kistik fibrozisli çocuklarda aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin akciğerde kronik kolonizasyon ve enfeksiyona yol açması en az olasıdır?

- A) *Haemophilus influenzae*
- B) *Pneumocystis jirovecii*
- C) *Staphylococcus aureus*
- D) *Burkholderia cepacia* complex
- E) *Stenotrophomonas maltophilia*

176. Dokuz yaşındaki erkek hasta, üç aydır aralıklı devam eden döküntü şikâyeti ile getiriliyor. Öyküsünden, döküntülerinin sıklıkla kaşıntı sonrası çıktığı ve 10-15 dakika içinde kendiliğinden düzeldiği öğreniliyor. Fizik muayenede kalem ucu ile deri çizildiğinde ürtikere ait ödem plağının düzgün şekilde oluştuğu görülüyor.

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kolinerjik ürtiker
- B) Dermografizm
- C) Vibratuar ürtiker
- D) Geç basınç ürtikeri
- E) Soğuk ürtikeri

177. Yedi aylık kız hasta kilo alamama nedeniyle getiriliyor. Öyküsünden; normal yolla, zamanında, 3.000 g ağırlığında doğduğu, 15 günlükken ağızda pamukçukla birlikte ishalinin başladığı bu nedenle iki kez hastaneye yatırılarak tedavi edildiği, kusmasının olmadığı, ilk altı ay anne sütü aldığı öğreniliyor. Anne ve babası hala-dayı çocukları olan hastanın fizik muayenesinde vücut ağırlığı 5.200 g, boyu 65 cm olup oral moniliyazis saptanıyor. Laboratuvar tetkiklerinde hemoglobin 9,8 g/dL, beyaz küre sayısı 6.500/mm³, mutlak lenfosit sayısı 500/mm³, mutlak nötrofil sayısı 5.000/mm³, IgG, IgA ve IgM düzeyleri yaşına göre düşük bulunuyor. Posteroanterior akciğer grafisinde timüs gölgesi saptanmıyor.

Bu hastadaki en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Süt çocuğunun geçici hipogamaglobulinemisi
- B) Kistik fibrozis
- C) Agamaglobulinemi
- D) Ağır kombine immün yetmezlik
- E) Yaygın değişken immün yetmezlik

178. Beş yaşındaki kız çocuk, ateş, hâlsizlik ve döküntü yakınmaları ile getiriliyor. Fizik muayenesinde ateş, taşikardi, kollarda ve gövdede maküler döküntüler saptanıyor. Laboratuvarında hemoglobini 7,2 g/dL, ortalama eritrosit hacmi 80 fL ve retikülositi %0,5 olarak tespit ediliyor. Diğer laboratuvar bulguları normal saptanıyor. Hastanın kemik iliği aspirasyonunda, özellikle eritroid öncüllerin matürasyonunda azalma/durulma ve dev pronormoblastlar görülüyor.

Bu tabloya neden olan en olası virus aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Parvovirus B19
- B) Rubella
- C) Hepatit B
- D) HIV
- E) Adenovirus

179. Lösemi tedavisi alan 10 yaşındaki erkek hastada yaygın morluklar gelişmesi ve nötropenik ateş nedeniyle kemoterapiye ara veriliyor. Hastanın burun kanaması zor durduruluyor. Tam kan sayımında anemi, nötropeni ve trombositopeni saptanıyor. PT ve aPTT'de uzama, fibrinojende düşüş ve D-dimer'de artış bulunuyor.

Bu hastada gelişen dissemine intravasküler koagülasyonun tanısına aşağıdakilerden hangisinin katkı sağlaması en az olasıdır?

- A) PT uzunluğu
- B) Fibrinojen düşüklüğü
- C) D-dimer artışı
- D) Nötropeni
- E) Trombositopeni

180. Akut lenfoblastik lösemi nedeniyle asparaginaz tedavisi verilen 14 yaşındaki hastada tedavi sonrasında nefes darlığı, yüzünde yaygın kızarıklık, hipotansiyon gelişiyor ve çocuk bulantı tarifliyor.

Bu hastadaki en olası tanı ve bu tanıya uygun öncelikli tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Alerjik reaksiyon düşünülüp steroid yapılmalıdır.
- B) Sepsis düşünülüp çoklu antibiyotik başlanmalıdır.
- C) Gastrit düşünülüp antiemetik uygulanmalıdır.
- D) Anafilaksi düşünülüp adrenalin yapılmalıdır.
- E) Hiperglisemi düşünülüp sıvı takviyesi yapılmalıdır.

181. Beş yaşındaki erkek hasta çenesinde şişlik yakınmasıyla başvuruyor. Öyküsünden yakınmasının bir ay önce başladığı ve ilk başvurduğu merkezde diş apsesi nedeniyle tedavi edildiği, ancak tedaviye rağmen çenesindeki şişliğin hızla arttığı ve şikâyetlerine hâlsizlik ve kilo kaybının da eklendiği öğreniliyor. Fizik muayenesinde soluk görünümde olan hastanın, çenesinde sağda 6x5 cm boyutlarında kitle, servikal, aksiller ve inguinal lenfadenopatiler tespit ediliyor. Batın ultrasonografisinde de paraaortik, portokaval lenfadenopatiler ve çekumda kitle saptanıyor. Laboratuvar incelemelerinde LDH 1.500 U/L, sedimentasyon hızı 90 mm/saat olarak bulunuyor.

Bu hastadaki en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?


- A) Burkitt lenfoma
- B) Rabdomiyosarkom
- C) Granülositik sarkom
- D) Nöroblastom
- E) Ewing sarkomu

182. Akut kalp yetersizliği bulguları ile acil servise gelen beş yaşındaki bir çocuğun kan basıncı 120/76 mmHg ve nabızı 130/dakika'dır. Ekokardiyografik incelemede sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %40 olarak saptanıyor.

Bu çocukta en uygun acil medikal tedavi seçeneği aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Dopamin + Klorotiazid B) Milrinon + Furosemid
C) Epinefrin + Spironolakton D) Dobutamin + Dopamin
E) Digoksin + Norepinefrin


183. Üç yaşındaki erkek çocuk, son bir haftadır hızlı nefes alıp verme ve halsizlik şikâyetleriyle hastaneye getiriliyor. Öyküsünden, benzer şikâyetlerle son bir ayda üç defa acil servise getirildiği ve bronşiyolit tanısı ile inhale tedavi verilip eve gönderildiği öğreniliyor. Fizik muayenesinde nabızı 140/dakika, solunum sayısı 60/dakika, kan basıncı 85/56 mmHg olan hastada, subkostal ve interkostal retraksiyonlar, her iki akciğer bazalinde raller, gallop ritmi ve hepatomegali (midklaviküler hatta 4 cm) saptanıyor. Hastanın ön-arka akciğer grafisi aşağıdaki gibidir.



Bu tabloya yol açan en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pnömoni B) Miyokardit
C) Atriyal septal defekt D) Fallot tetralojisi
E) Astim

184. On yaşındaki erkek hasta yürümede güçlük şikâyetiyle getiriliyor. Öyküsünden daha önce herhangi bir hastalığının olmadığı, son zamanlarda durgunlaştığı, konuşmasının azaldığı ve ders başarısının düştüğü öğreniliyor. Hastanın T2 ağırlıklı kraniyal manyetik rezonans görüntülemesi aşağıda görülmektedir.



Bu hastada en olası ön tanı ve tanı için kullanılacak en uygun laboratuvar tetkiki aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) Metakromatik lökodistrofi – N-asetil aspartat düzeyi
B) Adrenolökodistrofi – Çok uzun zincirli yağ asitleri düzeyi
C) Canavan hastalığı – Arilsülfataz A düzeyi
D) Alexander hastalığı – Biotinidaz düzeyi
E) Wilson hastalığı – Serum bakır düzeyi

185. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda fonksiyonel gastrointestinal bozukluklardan biridir?

- A) Besin alerjileri
B) Çölyak hastalığı
C) İnflamatuvar bağırsak hastalığı
D) Gastroözofageal reflü hastalığı
E) Abdominal migren

186. Aşağıdaki böbrek hastalıklarından hangisine Wilms tümörünün eşlik etmesi en olasıdır?

- A) Nail patella sendromu B) Pierson sendromu
C) Denys-Drash sendromu D) Lowe sendromu
E) Sistinosis

187. Periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve adenit (PFAPA) sendromu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Atakların çoğu tek doz steroid uygulamasına yanıt verir.
B) Ataklar, çoğu hastada büyüme ve gelişmeyi etkilemez.
C) Düzenli olarak kullanılan metotreksat atak sıklığı ve şiddetini azaltır.
D) Ataklar ortalama 5 gün sürer.
E) Hastaların çoğunda tonsilloadenoidektomi sonrası ataklar kontrol altına alınır.

188. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan ve infantlarda tonusun değerlendirilmesinde en uygun testtir?

- A) Gelişimsel refleksler
B) Patolojik refleksler
C) Traksiyon yanıtı, vertikal ve horizontal süspansiyon
D) Derin tendon refleksleri
E) Kas gücü

189. Yirmi aylık erkek bebek acil servise ateş nedeniyle getiriliyor. Vücut sıcaklığı 38,5 °C olan bebeğin beş dakika süre ile gözlerini bir noktaya diktiği, her iki kol ve bacakta atım şeklinde jeneralize tonik klonik nöbet geçirdiği görülüyor. Öz ve soygeçmişinden, on altı aylıkken de aynı özellikte 3-5 dakika süren ateşli nöbet geçirdiği, babasının da çocukluk döneminde ateşli nöbetleri olduğu öğreniliyor.

Bu hastadaki en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Katılma nöbeti
B) Basit febril konvülsiyon
C) Komplike febril konvülsiyon
D) Febril status epileptikus
E) Epilepsi



Şampiyonların Ders Notu



TUS Eylül 2021'de Tam

39

soruya referans verdi

Orijinal sorular ve kanıta dayalı görüntülü net referanslar için: www.tusdata.com

190. X'e bağlı resesif hastalığa sahip bir erkek bireyin, taşıyıcı olmayan sağlıklı bir kadın ile evlenmesi durumunda erkek çocuklarının yüzde kaçında hastalık ortaya çıkabilir?

- A) 0 B) 25 C) 50 D) 75 E) 100

191. Beş yaşındaki kız çocuk anaokulunda konuşmadığı için getiriliyor. Aile çocuğun evde konuştuğunu, dışarıda çekingen olduğunu söylüyor. Öyküsünden gelişim basamaklarının normal olduğu öğreniliyor.

Bu hastadaki en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İştihaz azlığı
B) Karşıt olma karşı gelme bozukluğu
C) Otizm spektrum bozukluğu
D) Bilişsel yetersizlik
E) Selektif mutizm

192. Üst gastrointestinal sistemde sindirilmeden alt gastrointestinal sisteme geçebilen, komensal mikroorganizmaların en az biri için selektif substrat olan ve kullanımı preterm bebeklerde nekrotizan enterokolit riskini azaltabilen gıda takviyesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Probiyotik B) Laktoferrin
C) Postbiyotik D) Anne sütü güçlendiricisi
E) Prebiyotik

193. Aydınlatılmış (bilgilendirilmiş) onam formu öncelikli olarak aşağıdaki etik ilkelerden hangisiyle ilişkilidir?

- A) Yararlılık B) Dürüstlük
C) Özerkliğe saygı D) Sırdaslık
E) Mahremiyet

194. Bir hafta önce intestinal obstrüksiyon nedeniyle sigmoid kolektomi + Hartmann prosedürü yapılan ve uç kolostomi açılan bir hasta, insizyon alanıyla sınırlı kızarıklık ve şişlik nedeniyle başvuruyor. Palpasyonda fluktuasyon tespit ediliyor ve ultrasonografide insizyon hattı boyunca kolleksiyon saptanıyor. Hastada lökositoz, taşikardi veya ateş tespit edilmiyor.

Bu hastanın tedavisine yönelik aşağıdakilerden hangisi ilk aşamada en uygundur?

- A) Hastaya acil laparotomi yapılır.
B) Apse kalın uçlu iğne ile aspire edilir ve kültüre gönderilir.
C) İnsizyon açılır, apse drene edilir ve antibiyotik başlanır.
D) İnsizyon açılır, apse drene edilir, kültür alınır ve yara eksplore edilir.
E) Apse kavitesine perkütan dren yerleştirilir, kültür alınır ve antibiyotik başlanır.

195. Acil servise başvuran 58 yaşındaki kadın hastanın kan şekeri 300 mg/dL ve serum sodyum değeri 128 mEq/L olarak ölçülüyor.

Bu hasta için düzeltilmiş sodyum değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 124,8 mEq/L B) 126,4 mEq/L
C) 129,6 mEq/L D) 131,2 mEq/L
E) 132,8 mEq/L

196.

- I. Platelet faktör 4'e (PF4) karşı gelişen antikorlar ile oluşur.
II. Düşük moleküler ağırlıklı heparinler HIT oluşturabilir.
III. En önemli özelliği sadece venöz trombozla ortaya çıkmasıdır.
IV. Trombosit sayısı 100.000/mm³ ün veya başlangıç düzeyinin %50 altına düşer.

Heparine bağlı trombositopeni (HIT) ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II B) II ve III
C) III ve IV D) I, II ve IV
E) I, III ve IV

197.

- I. Histopatolojisinde en sık adenokarsinom görülür.
II. Eş zamanlı kemoterapi ve radyoterapi ile tedavi başarısı yüksektir.
III. Patogenezinde en sık Epstein – Barr virus (EBV) rol oynar.
IV. Kadınlarda daha sık görülür.

Anal kanal kanserleriyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve III D) II ve IV
E) III ve IV

198. Aşağıdakilerden hangisi kritik yaralanması olan hastada hasar kontrol cerrahisine geçiş kriterleri arasında yer almaz?

- A) Alkaloz (pH >7,5)
B) Hipotermi (<34 °C)
C) Koagülopati
D) Masif transfüzyon
E) Uzayan ameliyat süresi

199.

- I. Hiperemi zonu
II. Koagülasyon zonu
III. Staz zonu

Termal yanık sonrası oluşan yukarıdaki yaralanma zonlarının hangilerinde yaralanmanın geri dönüşümü mümkün kesin olarak değildir?

- A) Yalnız II B) Yalnız III
C) I ve II D) I ve III
E) II ve III

200. Sirozlu hastalarda yapılacak cerrahi girişimlerin riskini belirlemede kullanılan Child-Turcotte-Pugh sınıflandırmasında aşağıdaki kriterlerden hangisi kullanılmaz?

- A) Özofagus varis varlığı B) Bilirübin düzeyi
C) Albümin düzeyi D) INR değeri
E) Asit varlığı

TUSDATA®
TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

EYLÜL 2021 TUSDATA Farkı ile

Puan Arttırıcılar

Dr. Zübeyde BURAN

Bir önceki kazandığı sınav **Puan artışı 20.848** Bir sonraki kazandığı sınav

T. Puanı: 50.120
K. Puanı: 47.070

T. Puanı: 70.970
K. Puanı: 68.425

201. Meme cerrahisinde aksiller diseksiyon sırasında aşağıdaki sinirlerden hangisinin kesilmesinin üst kolun medial yüzünün duyuşal iletimini bozması en olasıdır?

- A) Üçüncü interkostal sinir
- B) Dördüncü interkostal sinir
- C) Interkostobrakial sinir
- D) Torasikus longus sinir
- E) Beşinci interkostal sinir

202. Lobüler karsinoma in situ (LCIS) ve duktal karsinoma in situ (DCIS) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) LCIS'nin bilateral görülme olasılığı DCIS'ye göre daha yüksektir.
- B) LCIS'den gelişen invaziv kanserler çoğunlukla lobüler tiptedir.
- C) DCIS'de meme başı akıntısı ve kitle semptomları olabilirken LCIS'de semptom olmayabilir.
- D) LCIS yalnızca kadınlarda görülür.
- E) Pleomorfik LCIS, DCIS gibi tedavi edilir.

203. Tiroid kanseri cerrahisinde lenfadenektomi gruplarından olan superior veya anterior mediastinal nodlar boynun hangi düzey lenf nodu grubunda yer alır?

- A) III B) IV C) V D) VI E) VII

204. Aşağıdakilerden hangisinin özofagusun yassı hücreli karsinomu için risk oluşturması en az olasıdır?

- A) Gastroözofageal reflü hastalığı
- B) Sigara
- C) Akalazya
- D) Alkol
- E) Özofageal striktür

205.

- I. Aşırı kusmaya bağlı olarak özofagogastrik bileşkeden olan kanamadır.
- II. Spontan durmayan kanamalarda endoskopik epinefrin enjeksiyonu yapılabilir.
- III. Hastaların hiçbirinde cerrahi işleme gerek duyulmaz.

Mallory-Weiss sendromu ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III
- C) I ve II D) II ve III
- E) I, II ve III

206. Crohn hastalığı gastrointestinal sistemde aşağıdakilerin hangisinde daha fazla görülür?

- A) Rektum B) Anal kanal
- C) Duodenum D) Terminal ileum
- E) İnen kolon

207. Orta rektal arter aşağıdakilerden hangisinin dalıdır?

- A) Eksternal iliak arter B) İnternal iliak arter
- C) İnternal pudendal arter D) İnterior mezenterik arter
- E) Orta kolik arter

208. Akut anal fissür tedavisinde aşağıdakilerden hangisi ilk aşamada tercih edilmez?

- A) Sıcak oturma banyosu
- B) Topikal kalsiyum kanal blokörü
- C) Lateral internal sfinkterotomi
- D) Gaita yumuşatıcıları
- E) Topikal nitroglicerine

209. Ayakta direkt karın grafisinde "kahve çekirdeği" görüntüsünün aşağıdaki durumların hangisinde görülmesi en olasıdır?

- A) Çekal volvulus B) Sigmoid volvulus
- C) Gastrik volvulus D) Ogilvie sendromu
- E) Safra taşı ileusu

210. Akut apandisit tanısında kullanılan "öksürmekle sağ alt kadranda ağrı oluşması" bulgusuna ne ad verilir?

- A) Obturator B) Dunphy
- C) Psoas D) Cullen
- E) Rovsing

211. Laparoskopik apendektomi sonrası karın ağrısı, bulantı ve kusma şikâyetleriyle başvuran bir hastanın ultrasonografisinde ince bağırsağın antimezenterik duvarının bir bölümünün laparoskopik port yerinden cilt altına uzandığı ve strangüle olduğu tespit ediliyor.

Bu hastada tarif edilen en olası fıtık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Littre B) Richter
- C) Obturator D) Spigelian
- E) Amyand

212. Karaciğer apseleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Amebik apseler, piyoenik apselerle göre daha ileri yaşlarda görülür.
- B) Amebik apselerde diyabet öyküsü, piyoenik apselerle göre daha sık bulunur.
- C) Piyoenik apselerde sarılık, amebik apselerle göre tabloya daha sık eşlik eder.
- D) Amebik apselerde tedavide ilk seçenek perkütan drenajdır.
- E) Piyoenik apseler karaciğerin sol lobuna yerleşme eğilimindedir.



Dr. Onat GÜNER
Temel: 80.204 Klinik: 79.519
Fakülte derecesi değildi

KIBRIS İL BİRİNCİSİ



1.

Dr. Barış ÖZKALEMKAŞ

T.Puanı : 58.554 K.Puanı : 59.488

213. Biliyer semptomları olmayan 45 yaşındaki kadın hastanın jinekolojik kontrolleri için yaptırdığı abdominal ultrasonografisinde safra kesesi fundusunda sesil ve içinde mikrokistlerin olduğu 7 mm'lik adenomiyomatozis görüntüsü tespit ediliyor.

Bu hasta için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Laparoskopik kolesistektomi yapılması
- B) Açık kolesistektomi yapılması
- C) Açık kolesistektomi ve karaciğer yatağı rezeksiyonu yapılması
- D) Semptomlarının ve ultrasonografik olarak lezyon boyutunun takibi
- E) Lezyondan ince iğne aspirasyon biyopsisi alınması

214. Etiyolojilerine göre aşağıdaki akut pankreatitlerden hangisi diğerlerine göre **daha sık görülür?**

- A) İdiyopatik akut pankreatit
- B) Hiperlipidemik akut pankreatit
- C) İlaçlara bağlı akut pankreatit
- D) Otoimmün akut pankreatit
- E) Safra taşına bağlı akut pankreatit

215. Splenik kistlerin **en sık nedeni** aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Paraziter kistler
- B) Basit kistler
- C) Hemorajik kistler
- D) Psödokistler
- E) Kistadenomlar

216. Modifiye Duke Kriterleri'ne göre, aşağıdakilerden hangisi enfektif endokardit tanısında kullanılan majör klinik kriterlerinden biri **değildir?**

- A) Majör arteriyel emboli
- B) Ekokardiyografide kapakta apse saptanması
- C) On iki saatten daha uzun arayla alınan iki farklı kan kültüründe Staphylococcus aureus üremesi
- D) Tek bir kan kültüründe Coxiella burnetti üremesi
- E) Ekokardiyografide prostetik kapakta yeni parsiyel dehissens saptanması

217. Tiroglossal kanal kisti tanısı konulan bir hastanın tedavisinde **en etkili** cerrahi yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tiroid lobektomi + En blok kistektomi
- B) Total tiroidektomi
- C) Total tiroidektomi + En blok kistektomi
- D) Traktusu da içeren en blok kistektomi + Santral hiyoid kemik eksizyonu
- E) En blok kistektomi

218. Altmış yaşındaki erkek hasta; yaklaşık üç aydır 100 metre yürümekle baldırında ağrı olduğunu, dinlenmekle geçtiğini ve tekrar aynı mesafeyi yürüyebildiğini, ağrının pozisyonla bir ilgisi olmadığını ifade ediyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) L4-L5 seviyesinde fıtık oluşumu
- B) Kronik venöz yetmezlik
- C) Periferik arter hastalığı
- D) Akut derin ven trombozu
- E) Lenfanjit

219. Aşağıdaki anestezi ajanlarından hangisi NMDA reseptörleri üzerinden etki gösterir?

- A) Ketamin
- B) Midazolam
- C) Propofol
- D) Tiyopental
- E) Etomidat

220. Aşağıdakilerden hangisi kardiyopulmoner resüsitasyon uygulanan bir hastada kardiyak arrestin geri döndürülebilir nedenlerinden biri **değildir?**

- A) Hipovolemi
- B) Hipoksi
- C) Hipokinezi
- D) Hipotermi
- E) Hipokalemi

221. Künt toraks travmasıyla oluşan trakeobronşiyal yaralanmalar **en sık hangi lokalizasyonda görülür?**

- A) Sağ intermediyer bronşta ilk 2cm'de
- B) Ana karinanın 2-2,5 cm çevresinde
- C) Sağ üst lob bronşunda
- D) Sol üst lob bronşunda
- E) Sol alt lob-üst lob karinasında

222. Doğumsal diyafragma hernileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır?**

- A) Bochdalek hernisi posterolateral yerleşimli defektlere verilen addır.
- B) Doğumsal diyafragma hernileri sıklıkla sağ tarafta görülür.
- C) Doğumsal diyafragma hernilerine kardiyovasküler sistem anomalileri eşlik edebilir.
- D) Morgagni hernisi anteromedial yerleşimlidir.
- E) Doğumsal diyafragma hernisi olan hastalarda intestinal fiksasyon anomalileri ve buna bağlı intestinal obstrüksiyonlar görülebilir.

223. Anterior yolla yapılan füzyonlu bir servikal disk hernisi ameliyatından sonra görülmeye **en olası** komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Vokal kord paralizi
- B) Vena jugularis interna yaralanması
- C) Arteria carotis communis yaralanması
- D) Nervus accessorius yaralanması
- E) Tiroid krizi





Dr. Onat GÜNER
Temel: 80.204 Klinik: 79.519
Fakülte derecesi değildir

ERZURUM İL BİRİNCİSİ



Dr. Abdulrahman JAFAROV
T.Puanı : 74.897 K.Puanı : 74.615

224. Yirmi bir yaşındaki erkek hastanın öyküsünden; halı sahada futbol oynarken herhangi bir darbe olmaksızın, koşarken yönünü aniden değiştirdiği sırada dizinden bir ses geldiği ve dizinin hızlıca şiştiği öğreniliyor.

Bu hastanın dizinde aşağıdaki yaralanmalardan hangisi öncelikle düşünülmelidir?

- A) İç menisküs yırtığı
- B) Ön çapraz bağ yaralanması
- C) İç yan bağ yaralanması
- D) Patella çıkığı
- E) Patella kırığı

225. İki aylık erkek bebek, doğumunda sağ yanağında önce telanjiektazi olarak izlenen, ancak ilerleyen haftalarda büyüyerek koyu kırmızı renkli bir kitle haline gelen deri lezyonu nedeniyle getiriliyor. Fizik muayenesinde sağ yanakta lokalize, yüzeyinde kanama odağı izlenmeyen, 3x4 cm boyutlarında, düzensiz kenarlı, düzgün yüzeyli vasküler lezyon saptanıyor.

Başka bir sağlık sorunu bulunmayan bu bebek için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Embolizasyonu takiben cerrahi eksizyon
- B) Yakın takip ile konservatif yaklaşım
- C) Skleroterapi
- D) Nd: YAG lazer ile tedavi
- E) Doğrudan cerrahi eksizyon

226. Yüksekten düşme sonrası acil servise getirilen bir hastanın kan basıncı 110/65 mmHg ölçülüyor, hemoglobin 11,5 g/dL saptanıyor. Hastanın kontrastlı bilgisayarlı tomografisinde retroperitoneal bölgede hematoma eşlik eden, sol renal korteksten medullaya doğru 2 cm uzanan, ancak toplayıcı sisteme açılmayan renal kortikal laserasyon saptanıyor.

Bu hastadaki renal travmanın kaçınıcı derece olması en olasıdır?

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) V

227. Beş yaşındaki erkek hastanın akut otitis media atağı sırasında yüzünün sağ tarafında periferik fasiyal paralizi gelişiyor. Kulak muayenesinde zar hiperemik ve bombe olarak izleniyor.

Bu hastanın akut tedavisinde aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha az tercih edilir?

- A) Antibiyotik
- B) Steroid
- C) Fasiyal sinir dekompresyonu
- D) Miringotomi
- E) Orta kulaktaki pürülan akıntının aspirasyonu

228. Ateş, bulantı-kusma, baş ağrısı ve her iki gözde şiddetli ağrı şikâyetleriyle acil servise getirilen 40 yaşındaki kadın hastanın muayenesinde, bilateral propitozis, orbital konjesyon ve pitozis, sağ gözde total oftalmopleji tespit ediliyor. Öyküsünden, şikâyetlerin önce sağ gözde başlayıp daha sonra solda da ortaya çıktığı öğreniliyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sağ akut açığı kapanması glokomu
- B) Dev hücreli arterit
- C) Kavernoöz sinüs trombozu
- D) Pitüiter apopleksi
- E) Psödotümör orbita

229. Aşağıdaki maternal durumlardan hangisi gebelikte venöz tromboemboli riskini arttıran faktörlerden değildir?

- A) İleri anne yaşı (>35)
- B) Obezite
- C) Orak hücreli anemi
- D) Nefrotik sendrom
- E) Gebelik kolestazi

230. Birinci trimester ultrasonografik değerlendirme aşağıdakilerden hangisini icermeyiz?

- A) Uterin kavitede gestasyonel kesenin görüntülenmesi
- B) Çoğul gebelikte amnionisit ve koryonisitinin belirlenmesi
- C) Fetal kardiyak aktivitenin saptanması
- D) Tahmini fetal ağırlığının belirlenmesi
- E) Meternal uterus ve adnekslerin değerlendirilmesi

231. Otuz iki yaşındaki G1P0 tekil gebeliği olan kadının kendi ve eşine ait kan grupları sırasıyla, B Rh (-) ve A Rh (+) olup indirekt Coombs test sonucu negatiftir. Üçlü tarama testi trizomi 21 riski için 1/50 olarak raporlanan gebeye, 17. haftasında amniyosentez işlemi uygulanıyor.

Komplikasyonsuz amniyosentez işlemi sonrasında evine gönderilecek hastaya aşağıdakilerden hangisinin öncelikle yapılması en uygundur?

- A) Anti-D immünoglobulin
- B) Oral antibiyotik profilaksisi
- C) Kleihauer-Betke testi
- D) Bir hafta süre ile oral tokolitik tedavi
- E) Bir hafta süre ile intramusküler veya subkutan progesteron enjeksiyonu

232. Aşağıdakilerden hangisi insanda doğum eyleminin başlamasına katkıda bulunduğu düşünülen mekanizmalar arasında değildir?

- A) Fonksiyonel progesteron çekilmesi
- B) Plasenta kaynaklı CRH seviyesindeki anlamlı azalma
- C) Plasental – fetal adrenal endokrin aksın aktivasyonu
- D) Miyometriyumda oksitosin reseptörlerinin artışı
- E) Fetal membranlarda oluşan steril inflamatuvar yanıt





Dr. Onat GÜNER

Temet: 80.204 Klinik: 79.519

Fakülte derecesi değil

ŞANLIURFA İL BİRİNCİSİ



1.

Dr. Can Muhammed KAYA

T.Puanı : 68.787 K.Puanı : 66.797

233. Aşağıdakilerden hangisi ikizden ikize transfüzyon sendromuna (TTTS) ilişkin bulgularından bir değildir?

- A) Alıcı fetusta polihidramnios
- B) Verici fetusta umbilikal arter Doppler parametrelerinde bozulma
- C) Verici fetusta büyüme kısıtlılığı
- D) Verici fetusta megasistis
- E) Alıcı fetusta hidrops

234. Aşağıdaki yöntemlerden hangisinin ektopik gebelik tanısında yeri yoktur?

- A) Transvajinal ultrasonografi
- B) Serum β -hCG ölçümü
- C) Kuldosentez
- D) Histerosalpingografi
- E) Dilatasyon ve küretaj

235. Otuziki yaşında, iki çocuklu, son doğumunu 1 yıl önce yapmış olan kadın üç aydır süregelen yoğun ve uzamış menstrüel kanamaları nedeniyle başvuruyor. Hastanın herhangi bir kontraseptif yöntem kullanmadığı, ek hastalığının ve daha önce herhangi bir kanama şikayetinin olmadığı öğreniliyor.

Bu hastanın değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi öncelikli tetkik değildir?

- A) β -HCG
- B) Hemoglobin
- C) Platelet sayısı
- D) FSH
- E) TSH

236. Fertilitasını tamamlamış 49 yaşındaki kadın hastada tespit edilen 8 cm büyüklüğünde tek subseröz uterin miyom nedeniyle cerrahi işlem planlanmaktadır.

Aşağıdaki işlemlerden hangisi bu hasta için uygun değildir?

- A) Laparoskopik miyomektomi
- B) Laparotomik miyomektomi
- C) Histeroskopik miyomektomi
- D) Uterin arter embolizasyonu
- E) Abdominal histerektomi

238. Anovulasyonun etiyolojisinde aşağıdakilerden hangisinin rol oynaması en az olasıdır?

- A) Hipotiroidi
- B) Prolaktin salgılayan hipofizer tümör
- C) Anoreksia nervosa
- D) Ağır egzersiz
- E) Endometriozis

239.

- I. BRCA 1 mutasyonu
- II. BRCA 2 mutasyonu
- III. Lynch sendromu

Yukarıdakilerden hangileri over kanseri gelişme riskini arttırır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) I, II ve III

240. Yirmi bir yaşındaki cinsel aktif olmayan kadın hasta kasık ağrısı şikâyetiyle başvuruyor. Hastada sağ overden kaynaklanan kistik bir lezyon tespit ediliyor ve laparoskopi kararı alınıyor. Ameliyat sırasında sağ over yerleşimli, yaklaşık 6 cm çaplı ve düzgün kapsüllü kist dışında herhangi bir patolojik bulgu tespit edilmiyor. Kistin eksizyonu sırasında, kapsül rüptüre oluyor ve yağlı materyalle birlikte kıl içeriğinin Douglas boşluğuna döküldüğü izleniyor.

Bu kitle için en olası ön tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Seröz kistadenom
- B) Dermoid kist
- C) Folikül kisti
- D) Endometrioma
- E) Tuboovaryan apse

237.

- I. Östradiolün pik seviyeye ulaşması
- II. LH'nin pik seviyeye ulaşması
- III. Oositte birinci mayozün tamamlanması

Normal menstrüel siklusta ovulasyon öncesi gerçekleşen yukarıdaki olayların oluş sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) I - II - III
- B) I - III - II
- C) II - I - III
- D) II - III - I
- E) III - I - II

İşte **GERÇEK** başarı

Eylül 2021 TUS'unda



Şampiyonların Notu

230

soruya



HEDEF 65 (TUS Kampı) Notları

2520
sayfa

199

soruya



Hızlı Tekrar TUS KAMPI Notları

sadece
1102
sayfa

167

soruya

NET referans olmuştur.

Orijinal sorular ve net kanıtlar için;

www.tusdata.com

Tusdata'nın yorumları için www.tusdata.com adresini takip ediniz.

TEMEL BİLİMLER CEVAP ANAHTARI

1. B	25. B	49. D	73. B	97. B
2. A	26. C	50. B	74. D	98. C
3. D	27. A	51. E	75. C	99. B
4. C	28. C	52. E	76. D	100. B
5. E	29. C	53. C	77. B	101. A
6. B	30. D	54. B	78. A	102. E
7. E	31. C	55. A	79. C	103. E
8. B	32. E	56. B	80. E	104. D
9. A	33. C	57. D	81. B	105. E
10. B	34. D	58. E	82. B	106. E
11. C	35. D	59. E	83. B	107. C
12. E	36. C	60. B	84. A	108. D
13. C	37. C	61. D	85. A	109. E
14. D	38. A	62. A	86. C	110. B
15. B	39. A	63. C	87. A	111. A
16. E	40. D	64. A	88. A	112. E
17. D	41. E	65. C	89. C	113. C
18. D	42. B	66. D	90. D	114. A
19. D	43. C	67. D	91. B	115. B
20. D	44. A	68. A	92. D	116. D
21. C	45. B	69. A	93. C	117. A
22. E	46. E	70. D	94. E	118. A
23. D	47. C	71. C	95. B	119. A
24. B	48. D	72. E	96. A	120. D

KLİNİK BİLİMLER CEVAP ANAHTARI

121. D	145. E	169. C	193. C	217. D
122. C	146. C	170. E	194. D	218. C
123. E	147. C	171. C	195. D	219. A
124. A	148. D	172. C	196. D	220. C
125. E	149. D	173. E	197. D	221. B
126. E	150. E	174. C	198. A	222. B
127. A	151. D	175. B	199. A	223. A
128. D	152. A	176. B	200. A	224. B
129. D	153. A	177. D	201. C	225. B
130. A	154. B	178. A	202. B	226. C
131. E	155. B	179. D	203. E	227. C
132. E	156. D	180. D	204. A	228. C
133. C	157. B	181. A	205. C	229. E
134. E	158. C	182. B	206. D	230. D
135. D	159. D	183. B	207. B	231. A
136. B	160. B	184. B	208. C	232. B
137. C	161. D	185. E	209. B	233. D
138. B	162. C	186. C	210. B	234. D
139. C	163. B	187. C	211. B	235. D
140. C	164. C	188. C	212. C	236. C
141. E	165. A	189. B	213. D	237. A
142. C	166. D	190. A	214. E	238. E
143. B	167. A	191. E	215. A	239. E
144. A	168. D	192. E	216. A	240. B

Gururla...



- 27 Eylül 2021 itibariyle...
- TUSDATA; 37 TUS önce kurs faaliyetine başlamıştır..

Ruhumuzda **ŞAMPİYONLUK** var!

TUS

DUS

37 TUS
32 BİRİNCİ

12 DUS
11 BİRİNCİ

· 27 Eylül 2021 itibarıyla...

· TUSDATA; 37 TUS önce kurs faaliyetine başlamıştır..

· 07 Mart 2021 itibarıyla..

· Şu ana kadar toplam 12 DUS yapılmıştır..

YDUS

**2020
PEDIATRİ**



Uz. Dr. Deniz YILMAZ
YDUS Puanı: 83.12
YDUS BİRİNCİMİZ

**2020
DAHİLİYE**



Uz. Dr. Arif AKYILDIZ
YDUS Puanı: 89.06
YDUS ÜÇÜNCÜMÜZ

**2020
GENEL CERRAHİ**



Uz. Dr. Selim TAMAM
YDUS Puanı: 83.12
YDUS BİRİNCİMİZ

**2020
KADIN HAST. ve DOĞUM**



Uz. Dr. Eylem YOĞURTCUOĞLU
YDUS Puanı: 89.37
YDUS BİRİNCİMİZ